

5. ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

- 5.1. Засоби, що застосовуються в психіатрії
 - 5.1.1. Анксиолітики
 - 5.1.2. Антипсихотики
 - 5.1.3. Антидепресанти
 - 5.1.4. Препарати для лікування деменції
 - 5.1.5. Снодійні засоби
 - 5.1.6. Протипаркінсонічні засоби
 - 5.1.7. Протиепілептичні засоби
 - 5.1.8. Нормотимики (стабілізатори настрою)
 - 5.1.9. Інші засоби
 - 5.1.10. Препарати для лікування гіперкінетичного розладу у дітей
- 5.2. Засоби, що застосовуються в наркології
 - 5.2.1. Психолептичні засоби
 - 5.2.2. Засоби для загальної анестезії
 - 5.2.3. Засоби, що застосовуються при аддиктивних розладах
 - 5.2.4. Психоаналептики
 - 5.2.5. Протиепілептичні засоби
 - 5.2.6. Антипаркінсонічні засоби
 - 5.2.7. Антидоти
 - 5.2.8. Ентеросорбенти
 - 5.2.9. Нестероїдні протизапальні засоби
 - 5.2.10. Анальгетики
 - 5.2.11. Вітаміни
 - 5.2.12. Інші засоби, що застосовуються в наркології

5.1. Засоби, що застосовуються в психіатрії

5.1.1. Анксиолітики

- **Діазепам (Diazepam) *** [1]

Фармакотерапевтична група: N05BA01-Анксиолітики. Похідні бензодіазепіну

Основна фармакотерапевтична дія: анксиолітична, седативна, протисудомна, центральна міорелаксуюча дія, підвищує поріг больової чутливості, регулює нейровегетативні реакції. Механізм дії пов'язаний з ГАМК, що є гальмуючим медіатором у ЦНС. знижує активність ферменту ГАМК-трансамінази, за рахунок цього підвищує вміст ГАМК у мозку. З іншого боку, зростає чутливість мембран до ГАМК. Це посилює гальмуючий вплив ГАМК-ергічних нейронів на нейрони інших типів. Гальмуванням норадренергічних і дофамінергічних нейронів зумовлені седативний та снотворний ефекти. Протисудомна та міорелаксанта дії зумовлені гальмуванням відповідних нейронів коркових центрів і спинного мозку. Гальмування процесів збудження у сходовій ретикулярній системі призводить до розвитку анксиолітичного ефекту.

Показання для застосування ЛЗ: Гострі тривожно-фобічні і тривожно-депресивні стани, тривожні розлади^{ВООЗ}, алкогольні психози з явищами абстиненції^{БНФВООЗ}; делірій; епілептичний статус^{БНФВООЗ}, у складі комплексного лікування епілепсії^{ВООЗ}, правець, м'язові спазми^{БНО} при нейродегенеративних захворюваннях, у тому числі при травмах хребта, люмбаго, шийному радикуліті. Премедикація в анестезіології при оперативних втручаннях і складних діагностичних процедурах^{ВООЗ}; еклампсія при вагітності. Безсоння^{БНО} (тільки при тяжких розладах, особливо для пацієнтів, які мають критичні патологічні стани)

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Дозу препарату слід визначати індивідуально для кожного пацієнта. При невідкладних станах рекомендовано вводити в/венно. Разова доза - 10-20 мг залежно від віку та перебігу захворювання. Звичайна доза для дорослих - 5 мг/доба. Максимальна доза - до 30 мг на добу у кілька прийомів. Гострі тривожно-фобічні та тривожно-депресивні стани. Дорослим в/венно або в/м'язово в дозі 1-2 мл (5 - 10 мг). За необхідності вводять повторно в такій самій дозі через 3 - 4 години. При алкогольному деліріїю початкова доза 2 мл (10 мг) в/венно, потім 1 - 2 мл (5 - 10 мг) через кожні 3 - 4 години до зникнення гострих симптомів^{БНО}. Вища разова доза - 30 мг, вища добова доза - 70 мг. Епілептичний статус^{БНО, ВООЗ}. Дорослим по 1 - 2 мл (5 - 10 мг) в/венно повільно, можна повторювати через кожні 10 - 15 хв до досягнення загальної дози 6 мл (30 мг). Новонародженим (після 30 днів життя) і дітям віком до 5 років призначають в/венно в дозі 0,04 - 0,1 мл/кг (0,2 - 0,3 мг/кг), при необхідності повторюють введення через 10 - 15 хв. Дітям старше 5 років призначають 0,2 мл/кг (1 мг/кг) в/венно, при необхідності повторюють через 5 - 15

хв. Вища разова доза для введення дітям віком до 5 років не повинна перевищувати 5 мг діазепаму, старше 5 років - 10 мг діазепаму. *М'язові спазми при нейродегенеративних захворюваннях, травмах хребта.* Дорослим призначають 2 - 4 мл (10 - 20 мг) в/венно повільно або в/м'язово. М'язові спазми: 5 - 15 мг на добу у кілька прийомів. Спазми церебральної етіології в окремих випадках: 2 - 60 мг на добу у кілька прийомів. Новонародженим і дітям віком до 5 років - в/венно або в/м'язово 0,2 - 0,4 мл (1 - 2 мг), дітям старше 5 років - 1 - 2 мл (5 - 10 мг). За необхідності ін'єкцію повторюють через 3 - 4 години. Вища разова доза для введення дітям віком до 5 років не повинна перевищувати 5 мг діазепаму, старше 5 років - 10 мг діазепаму. *Правець.* Початкова доза для дорослих становить 2 мл (10 мг) в/венно повільно або в/м'язово, потім переходять на в/венне краплинне введення препарату зі швидкістю 5 - 15 мг/год. *М'язові спазми периферичного походження (люмбаго, шийний радикуліт).* Дорослим по 2 - 4 мл (10 - 20 мг) в/м'язово 1 - 2 рази до усунення гострих симптомів. *Анестезіологія, хірургія.* Дорослим 2 - 4 мл (10 - 20 мг) в/м'язово напередодні операції, 1 - 2 мл (5 - 10 мг) в/м'язово або в/венно повільно за 30 - 60 хв до операції або безпосередньо перед операцією. Після операції вводять 1 - 2 мл (5 - 10 мг) в/м'язово. Для досягнення короточасного наркотичного сну при терапевтичних і хірургічних втручаннях (малі хірургічні операції, вивихи, переломи, діагностичні заходи) дорослим вводять 2 - 6 мл (10 - 30 мг) в/венно повільно, дітям - 0,2 - 0,4 мл/кг (1 - 2 мг/кг). *Еклампсія при вагітності.* В/венно повільно 1 - 2 мл (5 - 10 мг), при необхідності надалі вводять в/венно краплинно (до 100 мг/добу). *Безсоння, пов'язане з тривогою у дорослих:* по 5 - 15 мг перед сном^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: підвищена стомлюваність, сонливість, м'язова слабкість. *З боку нервової системи:* атаксія, дизартрія, порушення мовлення, головний біль, тремор, запаморочення, погіршення настрою, гнів, ризик виникнення антероградної амнезії. *Психічні порушення:* неспокій, збудження, дратівливість, агресивність, марення, ворожість, нічні кошмари, галюцинації, психози, зміни поведінки та інші несприятливі поведінкові ефекти (переважно у дітей та в осіб літнього віку; у разі їх появи необхідно негайно припинити застосування препарату), сплутаність свідомості, емоційна бідність, зниження уваги, депресія, психози, порушення поведінки, делірій і напади судом, схильність до самогубства. Довготривале застосування препарату (навіть у терапевтичних дозах) може призвести до розвитку фізичної залежності: припинення терапії може спричинити синдром відміни або феномен рикошету. *З боку ШКТ:* нудота, сухість у роті або гіперсалівація, запор та інші шлунково-кишкові розлади. *З боку органів зору:* диплопія, нечіткість зору. *З боку ССС:* артеріальна гіпотензія, недостатність кровообігу, серцева недостатність, включаючи зупинку серця, ортостатичний колапс. *З боку сечовидільної системи:* нетримання або затримка сечі. *З боку шкіри:* шкірні реакції. *З боку органів слуху:* вертиго. *З боку дихальної системи:* пригнічення дихання, включаючи дихальну недостатність. *З боку гепатобіліарної системи:* дуже рідко - жовтяниця. *Інші:* біль у суглобах, зміна лібідо. Підвищення активності трансаміназ і лужної фосфатази.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату, гострий напад глаукоми, закритокутова глаукома, міастенія *gravis*, тяжка дихальна недостатність, синдром нічного апное, тяжка печінкова недостатність, фобічні або нав'язливі стани, хронічні психози, шок, кома, алкогольна та наркотична залежність (за винятком гострого абстинентного синдрому)

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	ДИАЗЕПАМ	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл.	0,005 г	№ 20 (10x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДИАЗЕПАМ	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл.	0,01 г	№ 20 (10x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ДІАЗЕПАМ-ЗН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", м. Харків, Україна	табл.	5 мг	№ 10x2, № 10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СИБАЗОН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", м. Харків, Україна	табл.	5 мг	№ 10x2, № 10x5	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СИБАЗОН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", м. Харків, Україна	р-н д/ін'єкцій	0,5%	№ 10, № 5x2, № 5x20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СИБАЗОН® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл.	0,005 г	№ 20 (10x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СИБАЗОН® ІС	Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ", Україна	табл.	0,01 г	№ 20 (10x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
II.	РЕЛАНІУМ	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	р-н д/ін'єкцій	10 мг/2 мл	№ 5, № 10, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	РЕЛАНІУМ®	Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ, Польща	р-н для ін'єкцій	5 мг/мл	№ 5, № 10, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Хлордіазепоксид (Chlordiazepoxide)**^[1]

Фармакотерапевтична група: N05BA02 - Ансіолітики. Психолептичні засоби. Похідні бензодіазепіну

Основна фармакотерапевтична дія: діє на багато структур ЦНС, насамперед – на лімбічну систему і гіпоталамус, тобто структури, пов'язані з регуляцією емоційної діяльності; має ансіолітичну, седативну та помірно виражену снодійну дію, також зменшує напруження скелетних м'язів і чинить протисудомний ефект; похідне бензодіазепіну; як і всі бензодіазепіни, підсилює гальмівну дію ГАМК-ергічних нейронів у ділянці кори головного мозку, таламуса і гіпоталамуса; знайдені специфічні для бензодіазепінів ділянки зв'язування, що являють собою білкові структури клітинної мембрани, які мають зв'язок з комплексом, що складається з рецептора ГАМК-А і хлорного каналу; механізм дії хлордіазепоксиду пов'язаний з модуляцією чутливості ГАМК-ергічного рецептора, що викликає збільшення спорідненості цього рецептора з гамма-аміномасляною кислотою (ГАМК) і є ендогенним гальмівним нейромедіатором; наслідком активності бензодіазепінового рецептора або ГАМК-А є збільшення транспорту іонів хлора всередину нейрона через хлорний канал; це призводить до гіперполяризації клітинної мембрани, в результаті чого відбувається пригнічення активності нейрона.

Показання для застосування ЛЗ: короткочасне симптоматичне лікування тривожних с-мів^{БНФ} - тривожні с-ми, що супроводжують психоорганічні розлади; тривожні с-ми, що супроводжують психотичні симптоми; тривожні с-ми з порушенням сну; тривожні с-ми іншої етіології; підвищений м'язовий тонус різного ґенезу; симптоматичне лікування г. с-му алкогольної абстиненції^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозування і тривалість лікування індивідуальні для кожного пацієнта і визначаються виключно лікарем; дорослим звичайно при тривожних станах застосовують до 30 мг/добу^{БНФ} в розподілених дозах кожні 6 – 8 год; у виключних випадках можливе застосування вищих доз залежно від індивідуальної потреби; МДД - 100 мг^{БНФ}; при тривожних станах із супутнім безсонням - 10 мг – 30 мг одноразово перед сном; стан збудження при г. с-мі алкогольної абстиненції 20 мг – 100 мг; при необхідності дозу повторюють через 2 - 4 год не перевищуючи 200 мг/добу; потім дозу зменшують до мінімальної підтримуючої, що достатня для усунення симптомів збудження; при стані підвищеного м'язового тону су 10 мг – 30 мг на добу в розділених дозах; хворим літнього віку (старше 65 років) хлордіазепоксид слід призначати у якомога менших ефективних дозах, що не перевищують половинні дози для дорослих; препарат рекомендують застосовувати короткочасно (не більше 4 тижнів) у зв'язку з небезпекою виникнення симптомів лікарської залежності.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, седатація, запаморочення, порушення рівноваги, сплутаність свідомості, дезорієнтація, атаксія; загальна слабкість, непритомність, відчуття сухості у роті, розлад зору (нечіткий зір, диплопія), дизартрія з невизрадною мовою та неправильною вимовою, амнезія, м'язовий тремор, шлунково-кишкові розлади, зниження лібідо, розлади менструального циклу, порушення функції печінки (включаючи жовтуху), зміни морфологічної картини крові (лейкопенія, агранулоцитоз), нетримання сечі, деяке зниження АТ, еритема, психомоторний неспокій, безсоння, підвищена збудливість і агресивність, м'язовий тремор, судоми.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до хлордіазепоксидів або будь-якого компонента препарату; г. ДН або пригнічення дихального центру; нав'язливі стани або фобії; хр. психози; дитячий вік; вагітність; лактація.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ЕЛЕНІУМ	Тархомінський фармацевтичний завод "Польфа" АТ, Польща	табл.	10 мг	№ 50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Оксазепам (Охазепам)**^[1]

Фармакотерапевтична група: N05BA04 - Ансіолітики. Похідні бензодіазепіну. Психолептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: ансіолітична, седативна дія; міорелаксанти і протисудомні в ластивості виражені слабше; усуває напруження, зменшує або пригнічує тривогу і страх, емоційне напруження; механізм дії пов'язаний з підсиленням ГАМК-ергічних процесів у головному мозку; ансіолітична дія препарату пов'язана головним чином з гальмуючим впливом на лімбічну систему.

Показання для застосування ЛЗ: неврози, неврозоподібні і психозоподібні розлади, при тривожних розладах^{БНФ}, що супроводжують неврози та інші психосоматичні порушення; при функціональних порушеннях сну^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тривожні розлади: 10-30 мг 3-4 р/д^{БНФ}, при лікуванні порушень сну: 10-30 мг за 1 годину до сну. Пацієнтів, які приймають оксазепам з приводу порушень сну, необхідно проінформувати про те, що у них після прийому препарату мають бути умови для безперервного 7-8-годинного сну. Застосовують в екстрених випадках для симптоматичного лікування тривоги. Тривалість лікування необхідно обмежити до мінімуму. Зазвичай воно складає від кількох днів до 2 тижнів, не має перевищувати 4 тижнів. Різка відміна може призвести до розвитку синдрому відміни (порушення сну і концентрації уваги, підвищеної дратівливості і навіть до психотичних розладів). В індивідуальних випадках після оцінки стану лікар може ухвалити рішення про подовження максимального часу лікування. Тривале застосування препарату не рекомендується у зв'язку з небезпекою розвитку толерантності і медикаментозної залежності. Слід приймати, запиваючи невеликою кількістю води. Для зняття симптомів тривоги рекомендується застосовувати найменші ефективні дози. Дозу препарату необхідно збільшувати поступово.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: рідко - порушення морфологічного складу крові, лейкопенія, часто - сонливість, у повільнення реакції, запаморочення, сплутана свідомість і дезорієнтація, м'язова слабкість, атаксія; рідко - головний біль, може розвинути дизартрія з невизрадною мовою і неправильною вимовою, порушення пам'яті (антеградна амнезія), порушення лібідо, часто - нечіткий зір, диплопія, рідко - нудота, диспептичні явища, відчуття сухості в роті, зміна слиновиділення, затримка сечі, нетримання сечі, м'язовий тремор, м'язова слабкість, відсутність апетиту, незначне зниження артеріального тиску крові, загальна слабкість, непритомність, дуже рідко - анафілактичні реакції, алергічні шкірні реакції (висип, свербіж, кропив'янка), підвищення активності печінкових ферментів, порушення функції печінки, що супроводжуються жовтяницею, порушення менструального циклу, парадоксальні реакції - психомоторний неспокій, збудження і агресивність, сплутаність свідомості, галюцинації, кошмарні сновидіння, марення, психози, дратівливість, неадекватна поведінка. Різке припинення лікування може спричинити синдром відміни і безсоння на зразок «рикошету». проявами синдрому відміни є головний біль, дзвін у вухах, м'язовий біль, збудження і емоційне напруження, руховий неспокій, мимовільні рухи, стан сплутаної свідомості і дезорієнтації, дратівливість, безсоння. Під час лікування може виявитися існуюча недіагностована депресія з суїцидальними думками.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до оксазепаму або будь-якого компонента препарату; наявність ідей, фобій, хронічні психози^{БНФ}; тяжка ДН незалежно від причини, с-м нічного апное^{БНФ}; тяжка печінкова та ниркова недостатність; закритокутова глаукома; міастенія; гостра порфірія^{БНФ}; застосування інших ЛЗ, які пригнічують ЦНС, алкогольна інтоксикація; вагітність (абсолютно - I тримістр); лактація, не рекомендується застосовувати дітям^{БНФ}.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ТАЗЕПАМ	Тархомінський фармацевтичний завод "Польфа" АТ, Польща	табл.	10 мг	№ 50 (25x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Альпразолам (Alprazolam)**^[П]

Фармакотерапевтична група: N05BA12 - Анксиолітики. Похідні бензодіазепіну

Основна фармакотерапевтична дія: має виражений анксиолітичний ефект, виявляє седативну, снотворну, протисудомну, міорелаксантну дію; похідне бензодіазепіну, для якого характерна наявність вираженого анксиолітичного ефекту, виявляє седативну, снотворну, протисудомну, міорелаксантну дію; однакового транквілізуючого ефекту можна досягти при використанні у 10 разів менших доз алпразоламу, у порівнянні з діазепамом; має антидепресивну дію, що аналогічна дії трициклічних антидепресантів у ЦНС в взаємодії із специфічними бензодіазепіновими рецепторами, що функціонально тісно зв'язані з рецепторами основного гальмового медіатора ЦНС - γ-аміномасляної кислоти (ГАМК), тому в результаті дії препарату відбувається посилення гальмуючого впливу ГАМК у ЦНС за рахунок підвищення чутливості ГАМК-рецепторів до медіатора в результаті стимуляції бензодіазепінових рецепторів.

Показання для застосування ЛЗ: тривожні стани^{БНФ}; невроз, який супроводжується відчуттям тривоги^{БНФ}, небезпеки, занепокоєння, напруження, погіршення сну, дратівливості, а також соматичними порушеннями; змішані тривожно-депресивні стани, невротичні реактивно-депресивні стани, які супроводжуються погіршенням настрою, втратою зацікавленості оточуючим середовищем, занепокоєнням, порушеннями сну, зниженням апетиту, соматичними порушеннями; невротичні депресії, які розвинулись на фоні соматичних захворювань; панічні розлади в поєднанні з фобічною симптоматикою або без неї.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози препарату підбирають індивідуально та коригують під час лікування залежно від ефекту та індивідуальної переносимості; рекомендується використовувати мінімальні ефективні дози; при тривожних станах, неврозом рекомендована початкова добова доза для дорослих становить 0,25 - 0,5 мг 3 р/добу^{БНФ}; за необхідності дозу збільшують на 0,25 мг кожні 3-4 дні залежно від тяжкості симптомів захворювання та реакції пацієнта на лікування; збільшення дози рекомендується починати з вечірньої дози; при виражених симптомах неспокою лікування можна починати з більш високих доз, МДД - 4 мг; пацієнтам літнього віку та послабленим пацієнтам на початку лікування призначають по 0,125 - 0,25 мг препарату 2-3 р/добу^{БНФ}; курс лікування, включаючи час необхідний для поступової відміни препарату, звичайно не повинний перевищувати 8 - 12 тижнів; доцільність більш тривалого курсу лікування варто серйозно звážати; при панічних розладах рекомендована початкова добова доза для дорослих становить 0,5 мг 3 р/добу^{БНФ}; у разі потреби дозу збільшують, але не більше ніж на 1 мг кожні 3-4 дні; чим вище дози, тим поступовіше слід їх збільшувати для того, щоб досягти повного терапевтичного ефекту ЛЗ; звичайно терапевтичний ефект досягається при застосуванні 5-6 мг/добу, а у тяжких випадках до 10 мг/добу; тривалість лікування кожного хворого визначають індивідуально; коли терапевтичного ефекту досягнуто і симптоми захворювання усунуто, дозу алпразоламу можна знижувати, але не швидше ніж по 0,5 мг кожні 3 дні; якщо розвивається с-м «відміни», дозу препарату можна знову збільшити, а пізніше відміну препарату здійснювати більш поступово; при депресіях рекомендована початкова добова доза для дорослих становить 0,5 мг 3 р/добу^{БНФ}; у разі потреби дозу збільшують до 4,5 мг/добу; початкову дозу рекомендується призначати перед сном, щоб мінімізувати денну сонливість; курс лікування, включаючи час необхідний для поступової відміни препарату, звичайно складає 8 - 12 тижнів.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, запаморочення, порушення координації рухів; головний біль, підвищення внутрішньоочного тиску, тремтіння, порушення мови, розгубленість, ейфорія або депресія; антероградна амнезія; у пацієнтів, що страждають на депресію, - розвинення гіпоманії або манії; нудота та блювання, сухість у роті, пронос або запор, пальпітація, гіпотензія, свербіж шкіри, висипання, спазми або слабкість скелетних м'язів, зміна апетиту та маси тіла, нетримання сечі, зниження статевого потягу, порушення менструального циклу, пригнічення дихання, лейкопенія, зниження гематокриту та вмісту гемоглобіну, підвищення рівня печінкових ферментів (лужна фосфатаза, АЛТ, АСТ) та білірубіну в плазмі, підвищення або зниження вмісту цукру в крові; у літніх пацієнтів - розвиток парадоксальних реакцій (занепокоєння, збудження, в орожість, галюцинації, марення, порушення поведінки).

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до алпразоламу або інших похідних бензодіазепіну, а також до будь-якого компонента препарату; г. глаукома; тяжка міастенія; тяжка ДН; с-м апное під час сну; хр. психоз; тяжкі порушення функції печінки; вік до 18 років; вагітність (особливо I тримістр); період лактації.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ЗОЛОМАКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл.	0,25 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОЛОМАКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл.	0,5 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗОЛОМАКС®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл.	1 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕУРОЛ 0.25	АТ "Зентіва", Чеська Республіка	табл.	0,25 мг	№ 30 (15x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	НЕУРОЛ 1,0	АТ "Зентіва", Чеська Республіка	табл.	1,0 мг	№ 30 (15x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ХЕЛЕКС	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл.	0,25 мг	№ 30 (15x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ХЕЛЕКС	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл.	0,5 мг	№ 30 (15x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ХЕЛЕКС	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл.	1 мг	№ 30 (15x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ХЕЛЕКС® SR	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл.	0,5 мг	№ 20, № 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ
ХЕЛЕКС® SR	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл.	1 мг	№ 20, № 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ
ХЕЛЕКС® SR	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл.	2 мг	№ 20, № 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Буспірон (Buspirone)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05BE01 - Засоби, що впливають на нервову систему. Анксиолітики.

Основна фармакотерапевтична дія: анксиолітична, седативна дія, усуває психічні та вегетативні симптоми страху; анксиолітичний ЛЗ, усуває психічні та вегетативні симптоми страху; механізм дії до кінця не встановлений, однак відомо, що буспірон має інший механізм дії, ніж бензодіазепіни та інші анксиолітичні засоби; виявляє спорідненість до серотонінових рецепторів 5HT_{1A} і помірну до D₂ в головному мозку; у серії доклінічних досліджень на експериментальних моделях була встановлена наявність у буспірону властивостей, типових для анксиолітиків та антидепресантів; не виявляє протисудомної та міорелаксуючої дії, не спричиняє звикання; після припинення застосування буспірон не спричиняє симптомів відміни або швидкого рецидиву симптомів тривоги.

Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування тривожних станів ^{БНФ} з домінуючими симптомами: тривоги ^{БНФ}, неспокою, напруженням, погіршенням сну, роздратованістю, а також соматичними порушеннями.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: режим дозування залежить від індивідуального стану здоров'я пацієнта на початковому рівні; на початку терапії призначають по 5 мг буспірону гідрохлориду 2-3 р/добу ^{БНФ}; для досягнення максимального терапевтичного ефекту добову дозу поступово підвищують до 15-30 мг; максимальна одноразова доза не повинна перевищувати 30 мг буспірону гідрохлориду, розподілених на декілька однократних денних доз ^{БНФ}; МДД не повинна перевищувати 45 мг ^{БНФ}; тривалість лікування - не більше 4 міс. Якщо необхідне тривале застосування препарату (до 6 міс.), слід проводити ретельний медичний моніторинг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: *з боку нервової системи:* запаморочення, безсоння, нервозність, сонливість, напівнепритомний стан, *з боку травного тракту:* нудота, головний біль та підвищена втомлюваність. Рідко - гнів та ворожість, сплутаність свідомості, нечіткість зору, діарея, біль у м'язах та кістках, оніміння, парестезії, порушення координації рухів, тремор та шкірні висипання, сухість у роті, слабкість, астения, підвищена пітливість, липка шкіра. поширені - неспецифічний біль у грудях, непоширені - тимчасова непритомність, артеріальна гіпотензія та/або гіпертензія, тахікардія/відчуття серцебиття; рідко поширені - порушення мозкового кровообігу, серцева недостатність, інфаркт міокарда, кардіоміопатія, брадикардія, цереброваскулярні порушення, *з боку системи крові:* рідко поширені - зміни показників крові (еозинофілія, лейкопенія, тромбопенія), *психічні порушення:* поширені - нічні жахи, сонливість, безсоння, запаморочення, нервозність, зниження концентрації уваги, емоційне збудження, дратівливість, ворожість, сплутаність свідомості, депресія, непоширені - деперсоналізація, дискордорт, патологічно підвищене сприйняття звичайних звуків, ейфорія, гіперкінезія, неспокій, втрата інтересу, порушення асоціативного сприйняття, галюцинації, суїцидальні думки, епілептичні напади, дисфорія, страх; рідко поширені - різка зміна настрою, клаустрофобія, ступор, нерозбірлива мова, минулі проблеми з пам'яттю, серотоніновий синдром, психоз. *З боку нервової системи:* непоширені - оніміння, парестезії (наприклад поколювання, відчуття болю), порушення координації, тремор, епілептичні напади, дисгевзія, дизосмія, подовження часу реакції; рідко поширені - спонтанні рухи, загальмованість, екстрапірамідні симптоми, включаючи ранню та пізню дискінезію, порушення тону су, гарячка, паркінсонізм, акатизія, шум у голові. *З боку органа зору:* поширені - помутніння зору; непоширені - почервоніння та свербіж у ділянці очей, кон'юнктивіт; рідко поширені - фотофобія, відчуття тиску на очі, біль в очах, звужене поле зору, підвищення внутрішньочного тиску. *З боку органа слуху:* поширені - шум у вухах; рідко поширені - ураження вуха. *З боку дихальної системи:* поширені - запалення горла, закладеність носа; непоширені - надмірно прискорене дихання, задишка, стиснення у ділянці серця, гіпервентиляція, відчуття нестачі повітря; рідко поширені - носова кровотеча, відчуття печіння язика. *З боку травного тракту:* поширені - нудота, ксеростомія, біль в епігастральній ділянці, діарея; непоширені - метеоризм, відсутність апетиту, підвищення апетиту, гіперсалівація, синдром подразнення товстого кишечника, кровотеча з прямої кишки, запор, блювання. *З боку сечовидільної системи:* непоширені - часте сечовипускання, затримка сечовипускання, дизурія; рідко поширені - енурез, нічне сечовипускання. *З боку шкіри:* непоширені - набряк, кропив'янка, гіперемія, виникнення гематом, облісіння, сухість шкіри, екзема, набряк обличчя, пухирчатка, припливи, уразливість шкіри, висипання на шкірі, свербіж; рідко поширені - алергічні реакції, екхімоз, акне, витончення нігтів. *З боку кістково-м'язової системи:* непоширені - спазм та ригідність м'язів, міалгія, артралгія; рідко поширені - міастенія. *З боку ендокринної системи:* рідко поширені - галакторея, гінекомастія, дисфункція щитовидної залози. *Метаболічні порушення:* непоширені - анорексія, підвищення апетиту; частота невідома - збільшення маси тіла, зменшення маси тіла. *Загальні порушення:* поширені - головний біль, астения; непоширені - гарячка, дзвін у голові, нездування, підвищена втомлюваність, порушення нюху та смакових відчуттів, підвищене потовиділення, припливи, холодова гіперестезія; рідко поширені - схильність до зловживання алкоголем, порушення коагуляції крові, втрата голосу, гикавка, глосалгія. *З боку гепатобілярної системи:* непоширені - збільшення печінкових ферментів. *З боку репродуктивної системи:* непоширені - порушення менструального циклу, зниження або підвищення лібідо; рідко поширені - аменорея, запалення сечостатевої системи, зниження еякуляції, імпотенція. *Лабораторні дослідження:* підвищення рівня трансаміназ у сироватці крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до буспірону або до одного з інгредієнтів; г. застійна глаукома; злоякісна міастенія; тяжка дисфункція печінки; тяжка ниркова недостатність; епілепсія; лактація; діти і підлітки до 18 років.

Торгова назва:

Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
---------------	-----------------	---------------	-----------	----------------------	----------------	----------------

II.	БУСПІРОН САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємств о компанії Сандоз, Німеччина	табл.	5 мг	№ 20 (10x2)	відсутня у реєстрі ОБЦ
	БУСПІРОН САНДОЗ®	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємств о компанії Сандоз, Німеччина	табл.	10 мг	№ 20 (10x2)	відсутня у реєстрі ОБЦ
	СПІТОМІН®	ВАТ Фармацев тичний зав од ЕГІС, Угорщина	табл.	5 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОБЦ
	СПІТОМІН®	ВАТ Фармацев тичний зав од ЕГІС, Угорщина	табл.	10 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОБЦ

5.1.2. Антипсихотики

• Хлорпромазин (Chlorpromazine) * [П]

Фармакотерапевтична група: N05AA01 - антипсихотичні засоби

Основна фармакотерапевтична дія: антипсихотичний, нейролептичний, седативний, міорелаксуючий, протиблювотний засіб, виявляє блокуючу дію на дофамінергічні та адренергічні рецептори; основною особливістю препарату є сполучення антипсихотичної дії зі здатністю впливати на емоційну сферу; механізм антипсихотичної дії зумовлений блокуванням постсинаптичних дофамінергічних рецепторів у мезолімбічних структурах головного мозку; в результаті послаблюються або цілком усуваються марення і галюцинації, купірується психомоторне збудження, зменшуються афективні реакції, тривога, занепокоєння, знижується рухова активність; внаслідок блокади дофамінергічних рецепторів збільшується секреція гіпофізом пролактину; блокуючи α -адренорецептори, виявляє виражений седативний ефект; наявність сильної седативної дії є однією з головних особливостей хлорпромазину у порівнянні з іншими нейролептиками; загальний заспокійливий ефект поєднується з пригніченням у мовнорефлекторної діяльності і насамперед рухово-захисних рефлексів, зменшенням спонтанної рухової активності, розслабленням скелетної мускулатури, зниженням реактивності до ендогенних і екзогенних стимулів при збереженні свідомості; вивляє виражений центральний та периферичний протиблювотний ефект; центральний ефект обумовлений пригніченням або блокадою дофамінових D2-рецепторів у хеморецепторній тригерній зоні мозочка, периферичний - блокадою блукаючого нерва в ШКТ; протиблювотний ефект підсилюється завдяки антихолінергічним, седативним та антигістамінним властивостям хлорпромазину; антихолінергічний ефект обумовлений конкурентною блокадою М-холінергетичних рецепторів; анксиолітичний, седативний та анальгезуючий - ослабленням збудження ретикулярної формації стовбура мозку; помірно знижує вираженість запальної реакції, зменшує проникність судин, знижує активність кінінів і гіалуронідази, вивляє слабку антигістамінну дію; зменшує систолічний та діастолічний артеріальний тиск, викликає тахікардію; має виражені каталептогенні властивості, пригнічує вивільнення гормонів гіпоталамуса і гіпофіза, виявляє слабку або помірну екстрапірамідну дію, проявляє гіпотермічну дію; потенціює дію анальгетиків, місцевозагнічуючих, снодійних та потисну домних засобів

Показання для застосування ЛЗ: хр. параноїдні і галюцинаторно-параноїдні стани, стани психомоторного збудження при шизофренії^{БНФ, ВООЗ} (галюцинаторно-маревний, гебефренічний, кататонічний с-ми), алкогольний психоз, маніакальне збудження при маніакально-депресивному психозі^{БНФ, ВООЗ}, психічні розлади при епілепсії, ажитована депресія у пацієнтів із пресенільним психозом, маніакально-депресивним психозом^{БНФ, ВООЗ}, а також інші захворювання, що супроводжуються збудженням^{БНФ, ВООЗ}, напруженням, неврологічними захворюваннями, що супроводжуються підвищенням м'язового тону; хвороба Мен'єра, блювання, лікування і профілактика блювання при лікуванні протигульмінними засобами і при променевої терапії; сверблячі дерматози; тривалі болі, в т. ч. каузальні (у сполученні з анальгетиками), зосередження сну стійкого характеру (у сполученні зі снодійними і транквилізаторами). Діти. Шизофренія, аутизм^{БНФ, ВООЗ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дорослих початкова доза становить 25-75 мг/добу, розподілена на 2-3 прийоми^{БНФ, ВООЗ}. Дозу можна поступово підвищувати до ефективно підтримуючої добової дози, яка зазвичай становить 75-300 мг, але деяким пацієнтам може знадобитися добова доза 1 г^{БНФ, ВООЗ}. У хворих літнього віку, при захворюваннях печінки і ССС дозу зменшують у 2-3 рази. Ослабленим пацієнтам і хворим літнього віку призначають до 300 мг на добу в/м або до 150 мг на добу - в/в. Затяжна гикавка. Дорослим призначають по 25-50 мг 3-4 р/добу^{БНФ}. Дітям старше 5 років призначають 1/3 - 1/2 дози дорослого; вища добова доза - 75 мг^{БНФ, ВООЗ}, розподілена на кілька прийомів. При в/м введенні вища разова доза становить 150 мг, добова - 600 мг, в/м вводять 1-5 мл 2,5 % р-ну не більше 3 р/добу. Курс лікування - кілька місяців, у високих дозах - до 1,5 місяця, потім переходять на лікування підтримуючими дозами, поступово знижуючи дозу на 25-75 мг на добу. При гострому психічному збудженні вводять в/м 100-150 мг (4-6 мл 2,5 % р-ну) або в/в 25-50 мг (1-2 мл 2,5 % р-ну препарату розводять у 20 мл 5 % або 40 % р-ну глюкози), при необхідності 100 мг (4 мл 2,5 % розчину - у 40 мл р-ну глюкози). Вводять повільно. При в/в введенні вища разова доза - 100 мг, добова - 250 мг. При в/м або в/в введенні дітям віком старше 1 р. разова доза становить 250-500 мкг/кг маси тіла^{БНФ}; дітям віком до 5 р. (маса тіла до 23 кг) - 40 мг/добу^{БНФ, ВООЗ}, 5-12 р. (маса тіла - 23-46 кг) - 75 мг/добу^{БНФ, ВООЗ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: атаксія, нечіткість зору, дистонічні екстрапірамідні реакції, паркінсонічний с-м, пізня дискінезія, порушення терморегуляції, злоякісний нейролептичний с-м, судоми; артеріальна гіпотензія, тахікардія; диспепсичні явища, холестатична жовтяниця, лейкопенія, агранулоцитоз; утруднення сечовипускання, дуже рідко - пріапізм; порушення менструального циклу, імпотенція, гінекомастія, збільшення маси тіла; шкірний висип, свербіж; можливі шкірні висипання, свербіж; рідко - екзофіативний дерматит, мультиформна еритема; дуже рідко - кропив'янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, системний червоний вовчак, відкладення хлорпромазину в передніх структурах ока (роговиці і кришталику), що може прискорити процеси нормального старіння кришталика.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до хлорпромазину та інших компонентів препарату; тяжкі порушення функції печінки, нирок, кровотворних органів, прогресуючі системні захворювання головного і спинного мозку, мікседема, тяжкі СС захворювання (декомпенсована СН, тяжка артеріальна гіпотензія), тромбоемболія; пізня стадія бронхоектатичної хвороби; закритокутова глаукома; затримка сечі, обумовлена гіперплазією передміхурової залози; виражене пригнічення центральної нервової системи, коматозний стан, інсульт, г. період ЧМТ, жовчокам'яна і сечокам'яна хвороби, г. інфекційні захворювання, вагітність, годування груддю, дитячий вік до 1 року. Не призначати одночасно з барбітуратами, алкоголем, наркотиками.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 0,1 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	АМІНАЗИН	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", м. Харків, Україна	р-н д/ін'єкцій в амп.	25 мг/мл	№ 10		відсутня у реєстрі ОБЦ
	АМІНАЗИН	АТ "Галичфарм", м. Львів, Україна	р-н д/ін'єкцій в амп., у конт.чар. упаковці	25 мг/мл	№ 10		відсутня у реєстрі ОБЦ
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м.Харків, Україна	табл., в/о	100 мг	№ 10, № 20		відсутня у реєстрі ОБЦ
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м. Харків, Україна	табл., в/о	50 мг	№ 10, № 20		відсутня у реєстрі ОБЦ
	АМІНАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м.Харків, Україна	табл., в/о	25 мг	№ 10, № 20		відсутня у реєстрі ОБЦ
	ХЛОПРОМАЗИН У ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", м. Харків, Україна	р-н д/ін'єкцій в амп.	25 мг/мл	№ 10		відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Трифлуоперазин (Trifluoperazine)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AB06 - антипсихотичні засоби. Піперазинові похідні фенотіазину.

Основна фармакотерапевтична дія: антипсихотичний засіб (нейролептик), піперазинове похідне фенотіазину, що має антипсихотичну, седативну, протиблювотну, каталептичну, гіпотензивну, гіпотермічну та слабку холіноблокуючу дію, також спрямовану проти гикавки; антипсихотична дія пов'язана із блокадою D2-дофамінових рецепторів мезолімбічної та мезокортикальної систем, блокадою α-адренорецепторів у ЦНС, підвищенням вивільнення гормонів гіпоталамусу та гіпофізу; седативна дія розвивається внаслідок блокади адренорецепторів ретикулярної формації стовбура головного мозку; протиблювотна дія пов'язана із блокадою периферичних і центральних D2-дофамінових рецепторів, блокадою закінчень блукаючого нерва в ШКТ; гіпотермічна дія розвивається за рахунок блокади дофамінових рецепторів гіпоталамусу; седативна дія та вплив на вегетативну нервову систему виражене слабше ніж в інших похідних фенотіазину, екстрапірамідна та протиблювотна дія - сильніше.

Показання для застосування ЛЗ: Психотичні розлади, у тому числі шизофренія ^{БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза для парентерального введення - 1-2 мг; в/м повторне введення проводять через 4-6 год; при більш частих ін'єкціях можливі явища кукульозу; добова доза як правило дорівнює 6 мг ^{БНФ}, у виняткових випадках - 10 мг; ; перорально разова доза для дорослих на початку лікування становить 5 мг ^{БНФ}, потім її поступово збільшують на 5 мг на прийом, до добової дози 30-80 мг (в окремих випадках - до 100-120 мг); добову дозу ділять на 2-4 прийоми; після досягнення ефекту оптимальні дози призначають протягом 1-3 місяців, а потім повільно зменшують до 5-20 мг/добу; останні дози застосовують надалі як підтримуючі; для осіб літнього віку лікування починають з половинної (або меншої) дози; підвищення дози проводять більш повільно; терміни лікування можуть становити 3-9 місяців і більше, залежно від ефективності терапії.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, сонливість, запаморочення, безсоння, акатизія, дистонічні екстрапірамідні реакції, псевдопаркінсонізм, пізня дисамнезія, злоякісний нейролептичний синдром, явища психічної індіферентності, запізнена реакція на зовнішні подразники, акінетико-ригідні явища, гіперкінези, тремор, вегетативні порушення, пізня дискінезія лицьових м'язів, дистонія, порушення терморегуляції, в тому, порушення свідомості, ригідність м'язів, судоми. *органи чуття:* парез акомодатії, ретинопатія, помутніння кришталіка та рогівки, порушення зорового сприйняття, кон'юнктивіт. *ШКТ:* сухість у роті, анорексія, булімія, нудота, блювання, діарея, запор, гастралгія, парез кишечника, тризм, протрузія язика. *Печінка та жовчовивідні шляхи:* холестатична жовтяниця, гепатотоксичність, гепатит. *ендокринна система та метаболічні порушення:* гіпо- або гіперглікемія, глюкозурія, порушення менструального циклу (дисменорея, аменорея), гінекомастія, збільшення маси тіла, галакторея, біль у грудях, лактація, порушення лібідо, гіперпролактинемія. *ССС:* тахікардія, зниження артеріального тиску (ортостатична гіпотензія), порушення ритму серця, зміни електрокардіограми (подовження інтервалу QT, згладжування зубця Т), напади стенокардії, шлуночковаритмія за типом torsades de pointes, зупинка серця. *система крові та кровотворення:* тромбоцитопенія, агранулоцитоз, анемія (гемолітична, апластична), панцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенічна пурпура, еозинофілія, сечостатична система: зниження потенції, порушення еякуляції, пріапізмі, затримка сечі, олігурія, порушення сечовиділення. *опорно-руховий апарат:* міастенія. *Дерматологічні порушення:* фотодермія, почервоніння шкіри, депігментація шкіри, екзофоліативний дерматит. *Алергічні р-ції:* шкірні висипи, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок. Набряки, хибнопозитивні тести на вагітність, фенілкетонурію.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату, декомпенсована СН, виражена артеріальна гіпотензія; кома будь-якої етіології; прогресуючі системні захворювання головного та спинного мозку; вагітність та період лактації; стенокардія; рак молочної залози; закритокутова глаукома; функціональна ниркова та печінкова недостатність; виразкова хвороба шлунка та ДПК в період загострення; епілепсія, хвороба Паркінсона; порушення механізму центральної регуляції дихання (особливо в дітей), с-м Рейно; кахексія; мікседема; гіперплазія передміхурової залози; патологічні зміни крові, пов'язані з порушенням кровотворення.

Визначена добова доза (DDD): парентерально - 8 мг.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
І.	ТРИФТАЗИН-ДАРНИЦЯ	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", м.Київ, Україна	р-н д/ін'єкцій в амп. У конт. чарунк.упак.	2 мг/мл	№ 10, № 5x2	4.12	
	ТРИФТАЗИН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м.Харків, Україна	табл.	5 мг	№ 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Флуфеназин (Fluphenazine)** ^[П]

Фармакотерапевтична група: N05AB02 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: сильний фенотіазиновий нейролептик. Є кращим блокатором церебральних допамінових D₂- та D₁-рецепторів, ніж інші стандартні нейролептики. Антихолінергічний та седативний ефекти виражені меншою мірою, ніж у деяких інших класичних нейролептиків. Блокада допамінових рецепторів відбувається у всіх трьох допамінових системах, нігостріарна, мезолімбічна та тубероінфундibuлярна, тому, окрім клінічної ефективності, також можливі різні небажані ефекти, зокрема екстрапірамідні реакції та збільшення секреції пролактину.

Показання для застосування ЛЗ: тривала підтримуюча терапія хр. форм шизофренії; профілактика загострень шизофренії ^{ВООЗ, БНФ}

Спосіб застосування та дози ЛЗ: початкова доза становить від 12,5 ^{ВООЗ, БНФ} до 25 мг препарату. Наступні дози і інтервали між введеннями визначаються індивідуально. Інтервал між окремими ін'єкціями звичайно становить від 15 до 35 днів ^{БНФ}. Якщо потрібні дози вище 50 мг, вони поступово збільшуються на 12,5 мг. Разова доза не повинна перевищувати 100 мг ^{БНФ}. Пацієнти, які раніше не лікувались фенотіазином, повинні спочатку проходити лікування ін'єкціями з короткотривалою дією або пероральними формами фенотіазину. Коли буде визначено, що пацієнти мають добру переносимість фенотіазину, вони можуть перейти на препарат прол. дії. Початкова доза 12,5 мг препарату вводиться в/м ^{ВООЗ, БНФ}. Якщо немає ніяких виражених побічних наслідків, то ч/з 5-10 днів може бути призначена наступна доза 25 мг. Потім доза індивідуально регулюється. Якщо пацієнт вже приймав фенотіазини, вони можуть бути замінені на препарат без попереднього лікування ін'єкціями з короткотривалою дією або пероральними формами. Застосовується початкова в/м доза 12,5 мг ^{ВООЗ, БНФ} для перевірки переносимості препарату, і потім доза регулюється індивідуально.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: в окремих випадках транзиторне збільшення концентрації холестерину в сироватці, поодинокі випадки дискразії крові при використанні похідних фенотіазину, транзиторна лейкопенія і тромбоцитопенія, поодинокі випадки появи антиядерних антитіл і розвитку системного червоного в овчачка, гострі дистонічні реакції, окулогічний криз та опістотонус, проциклідин, стани, що нагадують паркінсонізм між 2-ю і 5-ю добою після ін'єкції, однак часто їхня гострота знижується при подальшому лікуванні, розвиток нейролептичного злоякісного синдрому (НЗС) у хворих, які застосовували нейролептики, епізодично відмічаються сонливість, летаргія, порушення гостроти зору, сухість у роті, запори, утруднення сечовипускання або нетримання сечі, легка артеріальна гіпотензія, порушення інтелектуальних функцій, а також епілептоїдні напади, порушення зору, сухість у роті та запор, нічний енурез, нетримання сечі при напруженні, може відбуватися порушення статеві функції, галакторея, гінекомастія і/або оліго- або аменорея, артеріальна гіпертензія легкого ступеня, порушення терморегуляції, тяжка гіпотермія і гіперпірексія при використанні помірних і високих доз, шкірні висипи, реакції підвищення фоточувливості, поява жовтухи, порушення розумових і фізичних здатностей, що необхідні для керування автомобілем або при роботі з використанням складних механізмів, набрякання м'яких тканин, аномальна пігментація шкіри і поява зон помутніння в кришталику ока, пізня дискінезія, яка проявляється мимовільними хореоатетодними рухами язика, м'язів обличчя, рота або щелепи (наприклад, висовування язика, надування щік, скривлення рота, жувальні рухи), м'язами тіла або кінцівок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до флуфеназину або будь-якого компонента препарату; тяжкі розлади свідомості, виражений церебральний атеросклероз, субкортикальні церебральні розлади; ниркова, печінкова або серцева недостатність; гостр. інтоксикація інгібіторами ЦНС (алкоголь, антидепресанти, нейролептики, заспокійливі засоби, транквілізатори, снодійні засоби та наркотики), вагітність та період годування груддю; феохромоцитома, дитячий вік до 12 років.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
ІІ.	МОДИТЕН ДЕПО	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н д/ін'єкцій в амп.	25 мг/мл	№ 5	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Тіорідазин (Thioridazine)** ^[П]

Фармакотерапевтична група: N05AC02 - психолептичні засоби

Основна фармакотерапевтична дія: фенотіазиновий нейролептик зі специфічною психотерапевтичною дією; антипсихотична дія поєднується із заспокійливим ефектом без вираженої загальмованості, емоційної індіферентності, в'ялості; має помірну стимулюючу дію поряд з нейролептичною; помірний тимолептичний (антидепресивний) вплив; антихолінергічну активність, антигіпертензивний ефект; блокує постсинаптичні допамінергічні рецептори, справляє альфа-адреноблокуючу дію, пригнічує вивільнення гормонів гіпофіза гіпоталамуса, проте збільшує вивільнення гіпофізом пролактину

Показання для застосування ЛЗ: психічні та емоційні розлади, які супроводжуються страхом, напруженістю, збудженням. У психіатричній практиці - г. та підгостра шизофренія, органічні психози, психомоторне збудження, маніакально-депресивні стани, невротичні, с-м алкогольної абстиненції, психічні розлади поведінки дітей, збуджений стан у пацієнтів літнього віку

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози слід встановлювати в індивідуальному порядку; дорослі та підлітки: психічні та емоційні розлади, такі як шизофренія, маніакальні психози та подібні стани - 150 - 600 мг/добу; для г. шизофренії початкова доза може становити 200 мг; у резистентних пацієнтів під контролем лікаря можна підвищувати дозу до 800 мг/добу протягом курсу лікування, але не більше 4 тижнів; добова доза в амбулаторних умовах при психозах - 50 - 300

мг, при депресіях та при призначенні пацієнтам похилого віку - 25 - 200 мг, при алкогольній абстиненції - 100-200 мг, при тяжких порушеннях психіки непсихотичного характеру - 25 - 150 мг; як седативний засіб та анксиолітик препарат призначають дорослим у добовій дозі 10 - 75 мг; звичайні дози для застосування у педіатрії: дітям віком 4 - 12 років: 0,25 - 3 мг на 1 кг маси тіла на добу, розподілені на 2 - 4 прийоми; тяжкі розлади: по 25 мг 2 - 3 р/добу. МДД - 300 мг; при дозуванні не кратному 25 мг слід застосовувати тіорідазин у відповідних лікарських формах та дозуваннях

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Побічні дії мають дозозалежний ефект і зустрічаються при застосуванні надлишкової початкової дози: сонливість, загальмованість; псевдопаркінсонізм, сплутаність свідомості, гіперактивність, летаргія, психотичні реакції, головний біль, безсоння, емоційні порушення, порушення терморегуляції, зниження судомного порогу, непритомність, затуманення зору, закладеність носа, блідість, міоз, позіхання, галакторея, збільшення молочних залоз, набряки; артеріальна гіпотензія, тахікардія, відчуття серцебиття, подовження інтервалу QT, підвищення апетиту, диспегсія, збільшення маси тіла, гіпертрофія сосочків язика, сухість у роті, нудота, блювання, діарея, запор, анорексія, паралітична кишкова непрохідність; шкірні висипання, ексфолиативний та контактний дерматит, меланоз шкіри, реакції фоточутливості, агранулоцитоз, лейкопенія, еозинофілія, тромбоцитопенія, апластична анемія, панцитопенія; гарячка, набряк гортані, бронхоспастичний синдром, холестатична жовтяниця; акатизія, ажитація, дистонічні реакції, тризми, кривощія, опістотонус, тремор, ригідність м'язів; пізня дискінезія; зловиясний нейролептичний синдром; затримка сечовипускання, нетримання сечі, зниження лібідо, порушення еякуляції, дисменорея, гіперпролактинемія, парадоксальна ішурія, дизурія, приапізм

Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до похідних фенотіазину або до будь-якого компонента препарату; тяжкі депресивні стани, коматозні стани будь-якої етіології, ЧМТ, прогресуючі системні захворювання головного і спинного мозку, тяжка СС недостатність, синдром подовженого інтервалу QT, серцева аритмія в анамнезі, сплутане порушення серцевого ритму, виражена брадикардія, СА або атріовентрикулярна блокада провідності III ступеня; нескоригована гіпокаліємія або гіпомagneмія, тяжка артеріальна гіпотензія, феохромоцитома, порфірія, захворювання крові (гіпо- та апластичні процеси), вагітність і період годування груддю, дитячий вік до 4 років

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	РИДАЗИН® 10	Аль-Хікма Фармасьютикалз, Йорданія	табл.	10 мг	№ 20	28.65	3,60\$
	РИДАЗИН® 25	Аль-Хікма Фармасьютикалз, Йорданія	табл.	25 мг	№ 20	15.28	1,92\$
	СОНАПАКС® 10 мг	Фармзавод "Ельф" А.Т., Польща	табл.	10 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СОНАПАКС® 25 мг	Фармзавод "Ельф" А.Т., Польща	табл.	25 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ТІОРИЛ	Торрент Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл.	25 мг	№ 30	7.02	0,84\$

• **Хлорпротиксен (Chlorprothixene)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AF03 - психолептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: виражена антипсихотична та специфічна гальмуюча дія; седативний нейролептик з широким спектром дії; антипсихотичний ефект нейролептика пов'язаний з блокуючою дією на дофамінові рецептори, але також імовірно є певний внесок у цей процес блокади 5-HT (5-гідрокситриптамін)-рецепторів; має більш високу афінність до 5-HT₂-рецепторів і α₁-адреноцеторів, і у цьому відношенні він подібний до високодозових фенотіазинів, левомепразину, хлорпромазину, тіорідазину та атипічного нейролептика клозапіну; має високу гістамінну (H₁) афінність, що дорівнює афінності дифенгідраміну; демонструє високу афінність до холінергічних мускаринових рецепторів; рецепторозв'язуючий профіль хлорпротиксену досить подібний до профіля клозапіну, хоча має майже в 10 раз більшу афінність до рецепторів дофаміну; послаблює і знімає неспокій, тривогу, нав'язливі стани, психомоторне збудження, нетерплячість, безсоння, а також галюцинації, манії та інші психотичні симптоми; у низьких дозах має антидепресивну дію, що робить його корисним для лікування психічних розладів, що супроводжуються с-мом неспокою-тривоги-депресії; добре підходить для лікування психотичних станів, а також широкого спектра інших психічних порушень; крім того, посилює дію аналгетиків, має анальгезуючий ефект, протисверблячі та протиблювотні властивості; не викликає звикання, залежності та розвитку толерантності

Показання для застосування ЛЗ: шизофренія та інші психози з психомоторним неспокоєм, тривогою та збудженням; лікування абстиненції у алкоголіків та наркоманів; депресивні синдроми, неврози, психосоматичні розлади, що супроводжуються тривогою, напруженістю, невгамовністю, безсонням, порушеннями сну; епілепсія та олігофренія, пов'язані із психічними розладами, такими як еретизм, збудження, лабільність настрою та порушення поведінки; хр. біль (доповнення до аналгетиків). Геріатрія: гіперактивність, збудження, дратівливість, сплутаність свідомості, тривога, порушення поведінки та сну; педіатрія: розлади поведінки та сну.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим спочатку призначаються невеликі дози, які слід збільшувати до оптимального ефективного рівня так швидко, як це можливо, ґрунтуючись на досягнутому терапевтичному ефекті; шизофренія та інші психотичні стани, манія - початкова доза - 50 - 100 мг/добу з поступовим збільшенням до досягнення оптимального ефекту, звичайна оптимальна доза 300 мг/добу в окремих випадках може досягати 1 200 мг/добу за потребою; підтримуюча доза звичайно становить 100 - 200 мг/добу; через седативну дію доза повинна бути розділена з меншими дозами вдень і більшою - ввечері; лікування стану абстиненції у алкоголіків та наркоманів: 500 мг/добу у поділених дозах протягом 7 діб; після подання періоду абстиненції дозу слід повільно зменшувати; підтримуюча доза 100 мг може стабілізувати стан і зменшувати ризик рецидиву, з часом можливо подальше зменшення дози; депресивні синдроми, неврози, психосоматичні розлади: мінімальна доза 25 мг/добу, дозу поступово підвищують до 75-100 мг/добу, в тяжких випадках - до 150 мг/добу; добову дозу розділяють на три прийоми, та застосовують вранці 1/3 ввечірньої дози; порушення сну - 25 мг за 1 год до сну; епілепсія та олігофренія з психічними порушеннями - 25 - 50 мг/добу, збільшуючи до 75 - 125 мг/добу, в епілептиків повинна підтримуватися адекватна доза протисудомних препаратів; хр. болі - можливо

застосування у комбінації з анальгетиками 100 мг/добу, збільшуючи до 200 - 300 мг/добу; геріатрія - індивідуальний підбір у діапазоні 25 - 75 мг/добу; педіатрія: застосовують дітям старше 3 років у діапазоні 0,5-2 мг/кг маси тіла.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, екстрапірамідні симптоми; сухість у роті, диспепсія, нудота; гіпергідроз, міалгія; сонливість, астенія; дистонія, головний біль; постуральна гіпотензія, розлади ЧСС та ритму, тахікардія; збільшення маси тіла, порушення акомодативної функції, затримка сечі, судоми, реакції шкіри (висип, свербіж, еритема), збільшення світлочутливості, перехідна галакторея, менструальні розлади, зниження лібідо спостерігались у кількох пацієнтів, що отримували високі дози;

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого його компонента; циркуляторний колапс, депресія ЦНС будь-якого походження (алкогольна, барбітуратна чи опіоїдна інтоксикація), коматозний стан, пацієнтам з некоригованою гіпокаліємією та гіпомagneмією, пацієнтам зі спадковим синдромом подовженого інтервалу QT або встановленим набутим подовженим інтервалом QT, дитячий вік до 3 р.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ТРУКСАЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл.	25 мг	№ 100	13.32	1,32€
	ТРУКСАЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл.	50 мг	№ 50	13.15	1,26€

• **Зуклопентиксол (Zuclopenthixol) [П]**

Фармакотерапевтична група: N05AF05 - психолептичні засоби

Основна фармакотерапевтична дія: транзиторийний дозозалежний седативний ефект; похідне тіоксантену, що має залежний від дози седативний ефект; швидкий розвиток седативного ефекту на початку терапії (до появи антипсихотичної дії) є перевагою при лікуванні г. і підгострих психозів; толерантність до неспецифічного седативного ефекту препарату настає швидко; специфічна гальмуюча дія є особливою сприятливою при лікуванні пацієнтів із збудженням, неспокоєм, вожожістю та агресивністю; антипсихотичний ефект, як і щодо інших нейролептиків, пов'язують із блокадою дофамінових рецепторів, що може викликати ланцюгову реакцію, до якої залучаються й інші медіаторні системи. початкова седативна дія зазвичай сприятлива в початковій фазі психозу, оскільки заспокоює пацієнта до того, як встановлюється антипсихотичний ефект. у незначних кількостях проходить плацентарний бар'єр і у невеликих кількостях виділяється в грудне молоко.

Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. шизофренія та інші психози^{БНФ}, особливо з такими симптомами як галюцинації, манії та порушення мислення зі збудженням, неадекватною, вожожістю та агресивністю.; манакальна фаза манакально-депресивного психозу^{БНФ}; збудження або інші поведінкові розлади у пацієнтів з розумовою відсталістю; симптоми збудження та агресії у пацієнтів літнього віку з деменцією.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози підбирають індивідуально залежно від стану. дорослим рекомендуються дози в межах 50-150 мг^{БНФ} (1-3 мл). Ін'єкцію об'ємом понад 2 мл слід розділити між 2 місцями введення. Деяким пацієнтам додаткова ін'єкція може бути призначена через 24-48 годин після першої ін'єкції. тривалість терапії не повинна перевищувати 2 тижні. Максимальна сумарна доза за весь курс терапії - не більше 400 мг, а кількість ін'єкцій - не більше 4. на початку лікування слід застосовувати невеликі дози, які потім швидко збільшують до оптимального ефективного рівня залежно від клінічного ефекту. Підтримуючу дозу зазвичай приймають 1 р/д у вечірній час. Г. шизофренія та інші г. психози. Виражені гострі стани збудження. Манія. зазвичай 10-50 мг/добу. При виражених розладах і станах помірної тяжкості початкову дозу 20 мг/д можна, при необхідності, збільшити на 10-20 мг кожні 2-3 дні до 75 мг/добу і більше. Максимальна доза на один прийом 40 мг і 150 мг/доба^{БНФ}. Хр. шизофренія та інші хр. психози - підтримуюча доза дорівнює 20-40 мг/доба. Ажитация у пацієнтів із розумовою відсталістю. 6-20 мг/доба, при необхідності дозу можна збільшити до 25-40 мг/доба. Збудження та агресивність у пацієнтів літнього віку з деменцією. Призначають 2-6 мг/доба, можна збільшити до 10-20 мг/доба. Перехід на лікування пероральною формою. Через 2-3 дні після заключної ін'єкції препарату (100 мг) пацієнту слід призначити перорально щоденну дозу 40 мг; по можливості в декілька прийомів. При необхідності дозу можна збільшити на 10-20 мг через кожні 2-3 дні до 75 мг/доба або більше.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тахікардія, посилене серцебиття, подовження інтервалу QT на ЕКГ, тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз, сонливість, акатизія, гіперкінезія, гіпокінезія, тремор, дистонія, гіпертонія, запаморочення, головний біль, парестезія, порушення уваги, амнезія, порушення ходи, пізня дискінезія, гіперрефлексія, дискінезія, паркінсонізм, сіркопе, атаксія, розлади мовлення, гіпотензія, судоми, мігрень, злоякісний нейролептичний синдром, порушення акомодативної функції, зору, рухи очей, мідріаз, запаморочення, гіперчутливість, дзвін у вухах, закладений ніс, задишка, сухість у роті, гіперсекреція слини, запор, блювання, диспепсія, діарея, абдомінальний біль, нудота, метеоризм, розлади сечовипускання, затримка сечі, поліурія, гіпергідроз, свербіж, висип, реакції світлочутливості, порушення пігментації, себорея, дерматит, пурпура, міалгія, м'язова ригідність, тризм, кривошия, гіперпролактинемія, посилений апетит, збільшення ваги, знижений апетит, зниження ваги, гіперглікемія, порушення толерантності до глюкози, гіперліпідемія, артеріальна гіпотензія, рум'янець, астенія, втома, нездужання, біль, спрага, гіпотермія, пірексія, гіперчутливість, анафілактична реакція, порушення функціональних тестів, холестатичний гепатит, жовтяниця, в ідсутність еякуляції, еректильна дисфункція, оргастичні розлади у жінок, сухість вульвовагінальної ділянки, гінекомастія, галакторея, аменорея, пріапіз, безсоння, депресія, тривожливість, нервозність, патологічні сновидіння, зниження лібідо, апатія, кошмари, посилене лібідо, сплутана свідомість.

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, циркуляторний колапс, депресія ЦНС будь-якого походження (наприклад, алкогольна, барбітуратна чи опіоїдна інтоксикація), кома

Визначена добова доза (DDD): перорально - 30 мг, парентерально - 30 мг, парентерально - 15 мг (для депо-форм)

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	КЛОПІКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл.	2 мг	№ 100	10.35	1,05€
	КЛОПІКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл.	10 мг	№ 100	3.22	0,30€
	КЛОПІКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл.	25 мг	№ 100	2.33	0,23€

	КЛОПІКСОЛ ДЕПО	Х. Лундбек А/С, Данія	р-н д/ін'єкцій	200 мг/мл	№ 10	3.40	0,33€
	КЛОПІКСОЛ- АКУФАЗ	Х. Лундбек А/С, Данія	р-н д/ін'єкцій	50 мг/мл	№ 10	36.47	3,50€

• **Флюпентиксол (Flupenthixol) [П]**

Фармакотерапевтична група: N05AF01 - Психолептичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: має широкий спектр активності, що залежить від дози. спричиняє антидепресивний, ансіолітичний та активуючий ефект. Призначається для лікування гострих і хронічних психозів, крім значної редукції або повного усунення ядерних симптомів шизофренії, таких як галюцинації, марення та порушення мислення, флюпентиксол також має розгальмовуючі (антиаутистичні і активуючі) властивості, підвищує настрій, що робить флюпентиксол особливо ефективним при лікуванні апатичних, усамітнених, депресивних пацієнтів із слабкою мотивацією. Антипсихотичний ефект посилюється з підвищенням дози; додатково можна очікувати деяку седатію. Спричиняє ансіолітичний ефект і навіть при застосуванні високих доз ефекти розгальмування та піднесення настрою зберігаються. Лікування високими дозами не підвищує частоту екстрапірамідних симптомів.

Показання для застосування ЛЗ: депресії^{БНФ} легкого та помірного ступеня, які супроводжуються тривогою, астеною та втратою ініціативи^{БНФ}; хр. невротичні розлади, що супроводжуються тривожним станом, депресією та апатією^{БНФ}; психосоматичні розлади з астеничними реакціями; ситуаційно зумовлені тривожні розлади та стани емоційного напруження, які не потребують седативної гіпнотичної терапії, при зловживанні транквілізаторами; шизофренія та інші психотичні розлади^{БНФ}, що супроводжуються такими симптомами, як галюцинації, параноїдальне марення та порушення мислення, ускладнені апатією, анергією та аутизмом.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування дорослих з депресіями, хр. невротичними та психосоматичними розладами дози препарату визначаються індивідуально, відповідно до стану пацієнта - спочатку 1 мг/добу як разова доза вранці або по 0,5 мг 2 р/добу; ч/з тижд. дозу можна підвищити до 2 мг/добу, якщо клінічна реакція не є адекватною; щоденну дозу, більшу за 2 мг, необхідно давати окремими дозами, максимум до 3 мг^{БНФ}; якщо при максимальній дозі (3 мг щоденно) протягом тижня ефект не досягається, препарат необхідно відмінити; для лікування шизофренії та інших психотичних розладів дози препарату визначаються індивідуально, відповідно до стану пацієнта - у цілому, спочатку необхідно використовувати малі дози та підвищувати їх до оптимально ефективного рівня якнайскоріше, відповідно до терапевтичного ефекту, спочатку 3 - 15 мг/добу перорально, як дві або три дози на день, підвищуючи за необхідності до 40 мг/добу; підтримуюча доза - звичайно 5 - 20 мг/день, може прийматись як базова доза вранці; пацієнтам похилого в'язі необхідно призначення нижчих доз; пацієнтам із зниженою функцією нирок флюпентиксол призначається у звичайних дозах; пацієнтам з порушенням функцій печінки необхідно обережно визначати терапевтичну дозу, а також, за можливості, проводити визначення рівня препарату у сироватці крові; термін лікування залежить від перебігу хвороби та ефективності лікування. При підтримуючому лікуванні діапазон дозувань звичайно становить 20 - 40 мг (1-2 мл) кожні 2-4 тижні. При переході з лікування перорального на підтримуюче лікування слід керуватись нижченаведеною схемою: пероральна добова доза (мг) x 4 = доза(мг) в/м'язово кожні 2 тижні. Пероральна добова доза (мг) x 8 = доб. доза (мг) в/м'язово кожні 4 тижні. Слід продовжувати приймати пероральний препарат 1-й тижд. після першої ін'єкції, але у зменшеній дозі.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тахікардія, посилене серцебиття, подовження інтервалу QT на ЕКГ, тромбоцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз, сонливість, акатизія, гіперкінезія, гіпокінезія, тремор, дистонія, запаморочення, головний біль, пізня дискінезія, дискінезія, паркінсонізм, розлади мовлення, судоми, злоякісний нейролептичний синдром, порушення акомодатії, зору, рухи очей, задишка, сухість у роті, гіперсекреція слини, запор, блювання, диспепсія, діарея, абдомінальний біль, нудота, метеоризм, розлади сечовипускання, затримка сечі, гіпергідроз, свербіж, висип, реакції фоточутливості, дерматит, міальгія, м'язова ригідність, гіперпролактинемія, посилений апетит, збільшення ваги, знижений апетит, гіперглікемія, порушення толерантності глюкози, артеріальна гіпотензія, рум'янець, астенія, втома, гіперчутливість, анафілактична реакція, порушення функціональних тестів, жовтяниця, відсутність еякуляції, еректильна дисфункція, гінекомастія, галакторея, аменорея, безсоння, депресія, тривога, нервозність, зниження лібідо, стани сплутаності.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого його компонента; циркуляторний колапс, депресія ЦНС будь-якого походження (алкоголь, барбітуратна або опіїдна інтоксикація), коматозний стан.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 6 мг, парентерально - 4 мг (для депо-форм)

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	таб.	0,5 мг	№ 100	11.52	1,08€
	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	таб.	1 мг	№ 100	4.98	0,48€
	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	таб.	5 мг	№ 100	2.05	0,20€
	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	таб.	0,5 мг	№ 100	11.52	1,08€
	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	таб.	1 мг	№ 100	4.98	0,48€
	ФЛЮАНКСОЛ	Х. Лундбек А/С, Данія	таб.	5 мг	№ 100	2.05	0,20€
	ФЛЮАНКСОЛ ДЕПО	Х. Лундбек А/С, Данія	р-н д/ін'єкцій	20 мг/мл	№ 10	5.48	0,53€

• **Кветіапін (Quetiapine) [П]**

Фармакотерапевтична група: N05AH04 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: атипичний антипсихотичний препарат, що взаємодіє з великою кількістю нейротрансмітерних рецепторів; проявляє більш високе споріднення до рецепторів серотоніну (5-HT₂), ніж до рецепторів дофаміну D₁ та D₂ головного мозку; також має високе споріднення до гістамінергічних та адренергічних α₁-рецепторів і менше щодо α₂-адренергічних рецепторів; немає помітного споріднення до холінергічних мускаринових і бензодіазепінових рецепторів; проявляє антипсихотичну активність; викликає лише слабку каталепсію при використанні дози, що ефективно блокує допамінові D₂ рецептори; викликає селективне зменшення активності мезолімбічних A₁₀

допамінергічних нейронів порівняно з А9 нігростріатальними нейронами, втягнутими в моторну функцію, і проявляє мінімальну здатність до порушення тону у мавп, чутливих до нейролептиків; не викликає тривалого підвищення рівня пролактину; ефективний при лікуванні позитивних та негативних симптомів шизофренії. є ефективним при застосуванні двічі на добу.

Показання для застосування ЛЗ: шизофренія^{БНФ}; маніакальні епізоди, пов'язані з біполярними розладами^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим внутрішньо 2 р/добу, незалежно від прийому їжі; лікування шизофренії - добова доза для перших 4 днів терапії становить 1-й день - 50 мг, 2-й день - 100 мг, 3-й день - 200 мг, 4-й день - 300 мг^{БНФ}, починаючи з 4-го дня, доза повинна титруватися до звичайно ефективного дозування в межах від 300 до 450 мг/добу^{БНФ}; залежно від клінічного ефекту та індивідуальної чутливості пацієнта доза може варіювати в межах від 150 до 750 мг/добу^{БНФ}; лікування маніакальних епізодів, пов'язаних з біполярними розладами - добова доза для перших 4-х днів лікування становить 1-й день - 100 мг, 2-й день - 200 мг, 3-й день - 300 мг, 4-й день - 400 мг^{БНФ}; подальше збільшення дози відбувається не більше ніж на 200 мг щодня, аж до збільшення дозової дози до 800 мг^{БНФ}, починаючи з 6-го дня лікування; залежно від клінічного ефекту та індивідуальної чутливості доза може варіювати 200 - 800 мг/добу^{БНФ}; у літніх пацієнтів початкова доза кветіапіну повинна становити 25 мг/добу; доза повинна збільшуватися щодня на 25-50 мг^{БНФ} до досягнення ефективної дози, що, певно, буде меншою, ніж у більш молодих пацієнтів; кліренс кветіапіну при пероральному прийомі зменшується приблизно на 25% у пацієнтів з порушенням функції нирок чи печінки; активно метаболізується в печінці і, таким чином, повинен використовуватися з обережністю у пацієнтів з порушенням функції печінки; у пацієнтів з порушенням функції печінки або нирок терапія кветіапіном повинна починатися з 25 мг/добу, доза повинна збільшуватися щодня на 25-50 мг до досягнення ефективної дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: запаморочення, сонливість, головний біль, симптоми в'дміни, сухість у роті, лейкопенія, затуманення зору, естрапірамідні симптоми у дорослих, втрата свідомості, порушення серцевого ритму, тахікардія, запор диспепсія, астенія легкого ступеня збільшення маси тіла, периферичний набряк, підвищення рівнів сироваткових трансаміназ (АЛТ, АСТ), зниження числа нейтрофілів, підвищення глюкози крові до гіперглікемічних рівнів, риніт, ортостатична гіпотензія, еозинфілія, тромбоцитопенія, гіперчутливість, підвищення рівнів гамма-ГТ, підвищення рівнів тригліцеридів сироватки крові не натщесерце, підвищення загального холестерину, судоми, синдром неспокійних ніг, дизартрія, дисфагія, гепатит, злоякісний нейролептичний синдром, пріапізм, дискінезія, анафілактична реакція, цукровий діабет, ангіоневротичний набряк, синдром Стівенса-Джонсона.

Противоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату, одночасний прийом інгібіторів цитохрому Р₄₅₀, таких як інгібітори HIV-протеаз, азолмісних протигрибкових препаратів, еритроміцину, кларитроміцину та нефазодону.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	КВЕТИРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті п/о	100 мг	№ 10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КВЕТИРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті п/о	100 мг	№ 60	17.36	
	КВЕТИРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті п/о	100 мг	№ 30	20.52	
	КВЕТИРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті п/о	200 мг	№ 10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КВЕТИРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті п/о	200 мг	№ 60	16.52	
	КВЕТИРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті п/о	200 мг	№ 30	19.32	
	КВЕТИРОН 25	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті п/о	25 мг	№ 30	26.56	
II.	ГЕДОНІН	Герот Фармацеутика ГмбХ, Австрія	табл., в/о	100 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕДОНІН	Герот Фармацеутика ГмбХ, Австрія	табл., в/о	200 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ГЕДОНІН	Герот Фармацеутика ГмбХ, Австрія	табл., в/о	300 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТИЛЕПТ®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС/ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина/Угорщина	табл., в/о у фл., у бл.	25 мг	№ 30, № 60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТИЛЕПТ®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС/ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина/Угорщина	табл., в/о у фл., у бл.	100 мг	№ 30, № 60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЕТИЛЕПТ®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС/ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина/Угорщина	табл., в/о у фл., у бл.	200 мг	№ 30, № 60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕРОКВЕЛЬ	АстраЗенека ЮК Лімітед, Великобританія	табл., в криті п/о	25 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	СЕРОКВЕЛЬ	АстраЗенека ЮК Лімітед, Великобританія	табл., в криті п/о	100 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОБЦ	
							відсутня у реєстрі ОБЦ

СЕРОКВЕЛЬ	АстраЗенека ЮК Лімітед, Великобританія	табл., в криті п/о	200 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ
СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед, Великобританія	табл. прол. дії	50 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ
СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед, Великобританія	табл. прол. дії	200 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ
СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед, Великобританія	табл. прол. дії	300 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ
СЕРОКВЕЛЬ XR	АстраЗенека ЮК Лімітед, Великобританія	табл. прол. дії	400 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ

• **Клозапін (Clozapine)** [П]

Фармакотерапевтична група: N05AH02 - антипсихотичні препарати.

Основна фармакотерапевтична дія: має швидкий і виражений седативний ефект і чинить сильну антипсихотичну дію, зокрема у пацієнтів, резистентних до лікування іншими лікарськими препаратами; виявляє слабку блокуючу дію на допамінові D₁, D₂, D₃ і D₅-рецептори, але проявляє високу ефективність на D₄-рецептори, а також має анти-альфа-адренергічну, антихолінергічну, антигістамінну, антисеротонінергічну дію, ефективний відносно як продуктивної симптоматики шизофренії, так і негативної, не індукує катаlepsію або пригнічує тереотипну поведінку, спричинену введенням апорморфину або амфетаміну, застосування клозапін у знижує ризик суїцидальної поведінки у пацієнтів з шизофренією або шизоафективним розладом. На відміну від стандартних нейролептиків, не підвищує або майже не підвищує рівні пролактину.

Показання для застосування ЛЗ: Стійка до терапії шизофренія^{БНФ} (у разі відсутності ефекту від лікування класичними нейролептиками або при їх непереносимості^{БНФ}). Ризик рецидиву суїцидальних проб. Психотичні розлади протягом терапії хвороби Паркінсона^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Стійка до терапії шизофренія призначають внутрішньо (після їжі) 2-3 р/добу; разова доза для дорослих становить 50 - 200 мг, добова доза - 200 - 400 мг^{БНФ}; лікування зазвичай розпочинають з дози 25 - 50 мг^{БНФ}, потім поступово збільшують (по 25 - 50 мг на добу) до 200 - 300 мг на добу^{БНФ} протягом 7-14 днів; для підтримуючої терапії та амбулаторним хворим призначають по 25 - 200 мг/добу (можна у вигляді одноразової дози, прийнятої у вечірні год); при відміні лікування слід поступово знизувати дозу протягом 1 - 2 тижнів; МДД - 600 мг (0,6 г).

Психотичні розлади, що розвиваються в ході хвороби Паркінсона. Початкова доза-12,5 мг/добу прийнята як разова доза ввечері. Подальші збільшення дози повинні бути на 12,5 мг, з макс. збільшенням у 2 рази на тиждень до 50 мг, доза, яка не повинна бути досягнута до кінця 2 тижня. Підтримуюча доза -25 мг до 37,5 мг/добу, дозу можна обережно збільшувати на 12,5 мг на тиждень. Дозу 50 мг/день слід знизувати тільки у виняткових ситуаціях, а макс. доза ніколи не повинна перевищувати 100 мг/добу.^{БНФ} Закінчення терапії. Поступове зниження дози на 12,5 мг, принаймні за 1тижд.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: гранулоцитопенія, агранулоцитоз (як правило, розвивається протягом перших 18 тижнів лікування), лейкоцитоз а/або еозинофілія невідомої етіології (особливо протягом перших тижнів лікування); сонливість, підвищена втомлюваність, седативний ефект, запаморочення, головний біль, екстрапірамідні симптоми, як правило, легкого ступеня вираженості, розвиток ригідності, тремору, акатизії, зловісного нейролептичного с-му, епілептичні напади, судоми, міоклонічні посмикування; відчуття сухості у роті, порушення акомодатції, потовиділення та терморегуляції, гіпертермія, надмірне слиновиділення; тахикардія, ортостатична гіпотензія, непритомність (особливо у перші тижні лікування), АГ, колапс, який супроводжувався пригніченням або зупинкою дихання, синкопе; зміни на ЕКГ, розвиток аритмій, міокардиту; нудота, блювання, запор, підвищення активності ферментів печінки, розвиток холестазу; нетримання сечі та затримки сечовипускання; збільшення маси тіла, розвиток шкірних реакцій; в випадки раптової смерті,

Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до клозапін або до будь-якого компоненту препарату, зміни картини крові, порушення функції кісткового мозку, гранулоцитопенія або агранулоцитоз в анамнезі, неможливість регулярно контролювати показники крові, епілепсія, що не піддається контролю, алкогольний або інші токсичні психози, лікарські інтоксикації, коматозні стани, судинний колапс та/або пригнічення ЦНС будь-якої етіології, тяжкі порушення з боку нирок або серця, міокардит, г. захворювання печінки, що супроводжуються нудотою, втратою апетиту або жовтяницею; прогресуючі захворювання печінки, печінкова недостатність, паралітична непрохідність кишечника

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,3 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	АЗАЛЕПТОЛ	ЗАТ "Технолог", м. Умань, Черкаська обл., Україна	табл.	25 мг	№ 50	3.36	
	АЗАЛЕПТОЛ	ЗАТ "Технолог", м. Умань, Черкаська обл., Україна	табл.	100 мг	№ 50	2.04	
	АЗАПІН	ПАТ "Київський вітамінний завод", м. Київ, Україна	табл.	100 мг	№ 50	1.59	
	АЗАПІН	ПАТ "Київський вітамінний завод", м. Київ, Україна	табл.	25 мг	№ 50	2.90	
II.	АЗАЛЕПТИН	ВАТ "Органіка", м. Новокузнецьк, Російська Федерація	табл.	0.025 г	№ 50		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АЗАЛЕПТИН	ВАТ "Органіка", м. Новокузнецьк, Російська Федерація	табл.	0,1 г	№ 50		відсутня у реєстрі ОВЦ
	АЗАЛЕПТИН-АРПІ	СП АТЗТ "Арпimed", Республіка Вірменія	табл.	100 мг	№ 50		відсутня у реєстрі ОВЦ

Клозапін Сандоз	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, п-во компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, п-во компанії Сандоз/Лек С.А., Польща, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія/Польща	табл.	25 мг	№ 50, № 100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
Клозапін Сандоз	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, п-во компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, п-во компанії Сандоз/Лек С.А., Польща, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія/Польща	табл.	50 мг	№ 50, № 100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
Клозапін Сандоз	Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, п-во компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, п-во компанії Сандоз/Лек С.А., Польща, п-во компанії Сандоз, Німеччина/Словенія/Польща	табл.	100 мг	№ 50, № 100	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ЛЕПОНЕКС®	Новартіс Фармасьютикалс ЮК Лтд., Великобританія	табл.	25 мг	№ 50	20.09	2,52\$
ЛЕПОНЕКС®	Новартіс Фармасьютикалс ЮК Лтд., Великобританія	табл.	100 мг	№ 50	15.79	1,98\$

• **Оланзапін (Olanzapin)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AH03 - антипсихотичні засоби

Основна фармакотерапевтична дія: є антипсихотичним ЛЗ із широким спектром фармакологічної дії, що зумовлена впливом на різні рецептори; зв'язується з серотоніновими рецепторами 5HT_{2A/C}, 5HT₃, 5HT₆, допаміновими D₁, D₂, D₃, D₄, D₅, з мускариновими рецепторами M₁-M₅, адренергічним рецептором α₁ і гістаміновим H₁-рецептором; виявлено антагонізм препарату як до серотонінових рецепторів 5HT, так і до допамінових і холінергічних; селективно зменшує збудливість мезолімбічних (A10) допамінергічних нейронів, виявляючи при цьому незначний вплив на стріарні (A9) шляхи, пов'язані з моторною функцією; гальмує умовний рефлекс уникнення, що свідчить про його антипсихотичну активність при прийомі в дозах менших, ніж дози, що спричиняють каталепсію, яка є ознакою побічних моторних ефектів. У хворих на шизофренію з позитивними і негативними симптомами поліпшує як негативні, так і позитивні симптоми.

Показання для застосування ЛЗ: лікування шизофренії^{БНФ} купірування психомоторного збудження (ажитації) та порушень поведінки у пацієнтів із шизофренією^{БНФ} або маніакальними епізодами, манії, біполярні розлади (лікування та профілактика рецидивів маніакальних епізодів)^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: шизофренія, підтримуюча терапія біполярного розладу для пацієнтів у стані ремісії - початкова доза 10 мг 1 раз/добу^{БНФ}, наступну щоденну дозу визначають на підставі клінічного статусу, діапазон доз від 5 до 20 мг/добу^{БНФ}; г. манія, пов'язана з біполярним розладом - початкова доза як монотерапії - 15 мг/добу^{БНФ} або 10 мг/добу у комбінації з літєм чи вальпроатом, діапазон доз оланзапіну від 5 до 20 мг/добу^{БНФ}; перевищення рекомендованої початкової дози можливе після клінічного обстеження, яке проводять з інтервалами не менше 24 год; біполярна депресія, резистентна депресія: у комбінації з флуоксетином 1 раз/добу, ввечері, починаючи з 5 мг оланзапіну та 20 мг флуоксетину, корекцію дози можна проводити для кожного засобу (оланзапін, флуоксетин). Рекомендована початкова доза оланзапіну для ін'єкцій становить 10 мг^{БНФ} у вигляді одноразової в/м ін'єкції. К-ть ін'єкцій протягом 24 годин не має перебільшувати 3, а МДД становить 20 мг^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, збільшення маси тіла, запаморочення, втома, астенія, акатизія, підвищення апетиту, периферичний набряк, ортостатична гіпотензія, сухість у роті та запор, порушення ходи та падіння, нетримання сечі та пневмонія, нетримання сечі та пневмонія, сухість у роті, підвищення апетиту та тремор, підвищення апетиту, сонливість, підвищення АЛТ/АСТ, білірубіну, холестерину, ГГТ, пролактину, тригліцеридів, сухість у роті, синдром відміни,

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; закритокутова глаукома; вагітність, лактація; діти до 18 років.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ЕГОЛАНЗА	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/о	5 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕГОЛАНЗА	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/о	7,5 мг	№ 28 (7x4), № 56 (7x8)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕГОЛАНЗА	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/о	10 мг	№ 28 (7x4), № 56 (7x8)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕГОЛАНЗА	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/о	15 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕГОЛАНЗА	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/о	20 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ	

ЗИПРЕКСА®	Патеон Італія С.п.А (виробник)Ліллі Фарма Фертігунг унд Дістрібьюшен ГмБХ і Ко. КГ (пакувальник), Італія/Німеччина	порошок ліофілізований д/пригот. р-ну д/ін'єкцій	10 мг	№ 1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗИПРЕКСА®	Ліллі С.А (пакування)Ліллі дель Карібе Інк., Іспанія/ Пуерто-Ріко (США)	табл., в криті п/о	5 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗИПРЕКСА®	Ліллі С.А (пакування)Ліллі дель Карібе Інк., Іспанія/ Пуерто-Ріко (США)	табл., в криті п/о	10 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗИПРЕКСА® АДЕРА	Ліллі Фарма Фертігунг унд Дістрібьюшен ГмБХ і Ко. КГ (пакувальник)Елі Ліллі енд Компані, Німеччина/США	порошок д/пригот. сусп. д/ін'єкцій	210 мг	№ 1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗИПРЕКСА® АДЕРА	Ліллі Фарма Фертігунг унд Дістрібьюшен ГмБХ і Ко. КГ (пакувальник)Елі Ліллі енд Компані, Німеччина/США	порошок д/пригот. сусп. д/ін'єкцій	300 мг	№ 1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗИПРЕКСА® АДЕРА	Ліллі Фарма Фертігунг унд Дістрібьюшен ГмБХ і Ко. КГ (пакувальник)Елі Ліллі енд Компані, Німеччина/США	порошок д/пригот. сусп. д/ін'єкцій	405 мг	№ 1	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗИПРЕКСА® ЗИДИС	Каталент Ю.К. Свіндон Зидис Лімітед/Елі Ліллі енд Компані Лімітед/Ліллі С.А, Великобританія/Великоб ританія/Іспанія	табл., що диспергуються	5 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗИПРЕКСА® ЗИДИС	Каталент Ю.К. Свіндон Зидис Лімітед/Елі Ліллі енд Компані Лімітед/Ліллі С.А (пакування), Великобританія/Іспанія	табл., що диспергуються	10 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗОЛАФРЕН	ТОВ "Адамед", Польща	табл, в/о	5 мг	№ 30 (30x1)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ЗОЛАФРЕН	ТОВ "Адамед", Польща	табл, в/о	10 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПАРНАСАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (додаткове місце випуску серій)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., в криті п/о	2,5 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПАРНАСАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (додаткове місце випуску серій)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., в криті п/о	5 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПАРНАСАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (додаткове місце випуску серій)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., в криті п/о	7,5 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПАРНАСАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (додаткове місце випуску серій)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., в криті п/о	10 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ
ПАРНАСАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер"/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., в криті п/о	15 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ

ПАРНАСАН®	ВАТ "Гедеон Ріхтер" (додаткове місце випуску серій)/ТОВ "Гедеон Ріхтер Польща", Угорщина/Польща	табл., вкриті п/о	20 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ
-----------	---	----------------------	-------	-------------	---------------------------

• **Зипразидон (Ziprasidone)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AE04 - антипсихотичні засоби. Похідні індолу.

Основна фармакотерапевтична дія: має велику спорідненість з дофаміновими рецепторами типу 2 (D₂), велику спорідненість із серотоніновими рецепторами типу 2_A(5HT_{2A}), взаємодіє із серотоніновими 5HT_{2C}, 5HT_{1D} та 5HT_{1A}-рецепторами, причому його спорідненість з цими рецепторами така ж сама або перевищує спорідненість із дофаміновими D₂-рецепторами, має помірну спорідненість із нейрональними системами транспорту серотоніну або норадреналіну, помірну спорідненість з гістаміновими H₁-рецепторами та альфа₁-адренорецепторами. Антагонізм між цими рецепторами може виявлятися сонливістю та ортостатичною гіпотензією, виявляв незначну спорідненість із мускариновими M₁-холінорецепторами, антагонізм між цими рецепторами може виявлятися порушеннями пам'яті, виявляє в ластивості антагоніста відносно серотонінових 2_A(5HT_{2A})- та дофамінових 2(D₂)-рецепторів. Це передбачає, що антипсихотична активність препарату частково опосередкована поєднанням цих антагоністичних впливів.

Показання для застосування ЛЗ: лікування невідкладн. станів ажитації у пацієнтів із шизофренією, коли пероральна терапія є непринятною, лікування маніакальних або зміш. нападів, пов'язаних з біполярними розладами з/без ознак психозу.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендована доза становить 10 мг з можливим збільшенням за необхідності до 40 мг/добу. Наступні дози 10 мг можуть вводитися кожні 2 год. Деякі пацієнти можуть потребувати початкової дози 20 мг, з наступною дозою 10 мг через 4 год. Після цього дози 10 мг можуть вводитися кожні 2 год, але не повинні перевищувати МДД 40 мг. Введення шляхом в/м ін'єкцій більше 3 дн. не досліджувалося. При необхідності довготривалого лікування необхідно перейти на пероральне застосування зипразидону в капсулах (до 80 мг двічі на добу). Важливо не перевищувати МДД, оскільки профіль безпеки препарату для доз вищих 160 мг/день не підтверджений, а прийом зипразидону дозозалежно асоційований із подовженням інтервалу QT. *Шизофренія та біполярна манія.* початкова доза при лікуванні г. станів становить 40 мг 2 р/добу. Добова доза може коригуватися до 80 мг 2 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: седація, акатизія, екстрапірамідні порушення та запаморочення; занепокоєння, дистонія, паркінсонізм, сомноленція, порушення зору; нудота, блювання, закрепи, диспепсія, сухість у роті, гіперсекреція слини; анафілактичні р-ції; кістково-м'язова ригідність; астенія, втома; артеріальна гіпертензія, припливи, ортостатична артеріальна гіпотензія, пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует»,

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до зипразидону або будь-якого з наповнювачів; подовженням інтервалу Q-T і уродженім довгим інтервалом Q-T включно; г. ІМ; декомпенсована СН; аритмії, що лікуються а/аритм. засобами ІА та ІІІ класів. Сукупній прийом препаратів, що подовжують інтервал QT: а/аритм. засоби групи ІА та ІІІ класів.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 80 мг, парентерально - 40 мг.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ЗЕЛДОКС®	Пфайзер Меню фекчу ринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс.	40 мг	№ 14, № 28	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗЕЛДОКС®	Пфайзер Меню фекчу ринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс.	40 мг	№ 30	19.42	2,44\$
	ЗЕЛДОКС®	Пфайзер Меню фекчу ринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс.	60 мг	№ 10x3	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗЕЛДОКС®	Пфайзер Меню фекчу ринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс.	80 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЗЕЛДОКС®	Пфайзер Меню фекчу ринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина	капс.	80 мг	№ 14, № 28	18.55	2,33\$
	ЗЕЛДОКС®	Пфайзер Пі.Джі.Ем./Пфайзер Айленд Фармасьютікалз/Бен Веню Лабораторізі Інк./Фармація і Апджон Компані, Франція/Ірландія/США/США	порошок ліофілізов. д/пригот. р-ну д/ін'єкцій з розчинником	20 мг	№ 1	257.90	32,40\$

• **Рисперидон (Risperidone)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AX08 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: висока афінність щодо серотонінергічних 5-HT₂ і дофамінергічних D₂-рецепторів, зв'язується з α₁-адренергічними рецепторами та з меншою афінністю, - з H₁-гістамінергічними та α₂-адренергічними рецепторами, не виявляє афінності відносно холінергічних рецепторів, хоча є потужним D₂-антагоністом, що пов'язується з його ефективністю щодо продуктивної симптоматики шизофренії, не спричиняє значного пригнічення моторної активності та меншою мірою індукує каталепсію порівняно з класичними нейролептиками. Збалансований центральний антагонізм відносно серотоніну та дофаміну зменшує схильність до екстрапірамідних побічних ефектів і розширює терапевтичний вплив препарату з охопленням негативних та афективних симптомів шизофренії.

Показання для застосування ЛЗ: купірування г. нападів та тривала підтримуюча терапія г. та хр. шизофренії (включаючи перший епізод психозу^{БНФ}) та інших психотичних розладів з продуктивною (галюцинації, марення, розлади мислення, ворожість, підозрілість) та негативною (загальмованість емоцій, емоційна та соціальна відчуженість, убогість мовлення) симптоматикою; афективних розладів при шизофренії (тривога, страх, депресія); порушень поведінки у

пацієнтів з деменцією при прояві симптомів агресивності^{БНФ} (спалахи гніву, фізичне насильство), поведінкових порушень (ажитація, марення) або психотичних симптомів; розладів поведінки у випадках, якщо агресивна або деструктивна поведінка^{БНФ} (імпульсивність, аутоагресія) є провідною в клінічній картині хвороби; маніакальні епізоди при біполярних розладах; аутизм у дітей та підлітків.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: Шизофренія: прийом препарату з 2 мг/добу^{БНФ}, на 2-й день доза може бути збільшена до 4 мг^{БНФ}. Після цього дозу можна підтримувати без змін або продовжувати індивідуальну корекцію. Для більшості пацієнтів доза 4 - 6 мг/д^{БНФ} може бути показаною поступово з підвищення дози та зниження початкової дози. Дози, які перевищують 10 мг/д, не виявили вищої ефективності порівняно з меншими, але можуть спричиняти появу екстрапірамідних симптомів. Безпека доз, що перевищують 16 мг/д, не вивчалась, ці дози застосовувати не можна^{БНФ}. Біполярний розлад-початкова доза - 2 мг^{БНФ} або 3 мг 1р/д. Можна збільшити, додаючи по 1 мг/добу не частіше ніж ч/з день. Оптимальною дозою є 1-6 мг/д^{БНФ}. Порушення поведінки хворих з деменцією. Початкова доза - 0,25 мг 2р/д можна збільшити додаючи по 0,25 мг 2р/д не частіше ніж ч/з день^{БНФ}. Оптимальною дозою є 0,5 мг 2 р/д. У деяких пацієнтів ефективна доза може бути збільшена до 1 мг 2р/д^{БНФ}. Після досягнення ефективної дози пацієнт може бути переведений на одноразовий прийом 1 мг. Асоціальні прояви та інші порушення поведінки. Пацієнти з масою тіла >50 кг. Рекомендована початкова доза - 0,5 мг 1р/д^{БНФ}, можна коригувати додаючи 0,5 мг 1р/д не частіше ніж ч/д. Оптимальна доза - 1 мг 1р/д^{БНФ}. Для деяких пацієнтів для досягнення позитивного ефекту достатньо не більше 0,5 мг 1р/д, в той час як інші можуть потребувати 1,5 мг 1р/д. Пацієнти з масою тіла < 50 кг. Рекомендована початкова доза - 0,25 мг 1р/д, дозу можна коригувати додаючи 0,25 мг 1р/д не частіше ніж ч/д. Оптимальна доза - 0,5 мг 1р/д^{БНФ}. Для деяких пацієнтів достатньо не більше ніж 0,25 мг 1р/д для досягнення позитивного ефекту, в той час як інші можуть потребувати 0,75 мг 1р/д. Аутизм. Початкова доза становить по 0,25 мг/добу для пацієнтів з масою тіла < 20 кг і 0,5 мг/добу для пацієнтів з масою тіла >20 кг. На 4 день доза може бути збільшена на 0,25 мг для пацієнтів з масою тіла < 20 кг і на 0,5 мг для пацієнтів з масою тіла ≥20 кг. Ця доза повинна підтримуватися та ефективність має бути оцінена на 14 день. Збільшення дози можна проводити з інтервалом ≥2 тижні з поступовим збільшенням на 0,25 мг для пацієнтів з масою тіла < 20 кг та 0,5 мг для пацієнтів з масою тіла ≥20 кг. У клінічних дослідженнях МД не перевищувала суму добової дози 1,5 мг у пацієнтів з масою тіла < 20 кг, 2,5 мг у пацієнтів з масою тіла ≥ 20 кг та 3,5 мг у пацієнтів з масою тіла > 45 кг.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: Назофарингіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, синусит, інфекції сечовивідних шляхів, пневмонія, целюліт, грипоподібний с-м'анемія; полідипсія, анорексія, безсоння, тривога, нервовість, безсоння, в'ялість, сплутаність свідомості; паркінсонізм, акатазія, сонливість, запаморочення, седація, тремор, дистонія, летаргія, ортостатичне запаморочення, дискінезія, втрата свідомості, транзитрна ішемічна атака, порушення свідомості, слинотеча, цереброваскулярні розлади, головний біль, дизартрія, порушення уваги, розлади рівноваги, гіперсомнія; нечіткість зору, кон'юнктивіт; біль у вухах; тахікардія, відчуття серцебиття, ортостатична гіпотензія, артеріальна гіпотензія; закладеність носа, диспное, носова кровотеча, синусит, кашель, ринорея, фаринголарингічний біль, легеневий застій; нудота, запор, диспепсія, блювання, діарея, гіперсекреція слини, сухість у роті, абдомінальний дискомфорт, абдомінальний біль, відчуття дискомфорту у шлунку, біль у верхній частині живота; висипи, сухість шкіри, лупа, себорейний дерматит, гіперкератоз, еритема, акне, свербіж, біль у спині, артралгія, біль у кінцівках, порушення постави, міалгія, біль у шиї, нетримання сечі, енурез, полакіурія, порушення еякуляції, галакторея, стомленість, астенія, пірексія, біль у грудях, периферичні набряки, порушення ходи, в'ялість, дискомфорт у грудях.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 5 мг, парентерально - 2,7 мг.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	НЕИРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м.Харків, Україна	табл., в/о у бл.	0,5 мг	№ 10x2, № 10x6	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕИРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м.Харків, Україна	табл., в/о у бл., у контейн.	1 мг	№ 10x6, № 100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕИРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м.Харків, Україна	табл., в/оу бл.	2 мг	№ 10x6, № 100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	НЕИРИСПІН-ЗДОРОВ'Я	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м.Харків, Україна	табл., в/о у бл. Та у контейн.	4 мг	№ 10x2, № 10x6, № 100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИСПЕРОН	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл., в криті плівк. обол.	2 мг	№ 10, № 10x2	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	АРИС	Ранбаксі Лаботорізі Лімітед, Індія	табл., в криті п/о	1 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИС	Ранбаксі Лаботорізі Лімітед, Індія	табл., в криті п/о	2 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИС	Ранбаксі Лаботорізі Лімітед, Індія	табл., в криті п/о	4 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗАРИС	Каділа Хелткер Лтд., Індія	табл., в/о	1 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗАРИС	Каділа Хелткер Лтд., Індія	табл., в/о	2 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	ЗАРИС	Каділа Хелткер Лтд., Індія	табл., в/о	4 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	РИДОНЕКС®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в криті п/о	1 мг	№ 20	відсутня у реєстрі ОБЦ	

РИДОНЕКС®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в криті п/о	2 мг	№ 20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИДОНЕКС®	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл., в криті п/о	4 мг	№ 20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПАКСОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., в/о	1 мг	№ 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПАКСОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., в/о	2 мг	№ 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПАКСОЛ®	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., в/о	4 мг	№ 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕН 1	АТ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., в/о	1 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕН 2	АТ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., в/о	2 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕН 3	АТ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., в/о	3 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕН 4	АТ "Зентіва", Чеська Республіка	табл., в/о	4 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕРИДОН САНДОЗ	Новартіс Лтд., Бангладеш	табл., в криті п/о	1 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕРИДОН САНДОЗ	Новартіс Лтд., Бангладеш	табл., в криті п/о	2 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕРИДОН САНДОЗ	Новартіс Лтд., Бангладеш	табл., в криті п/о	3 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕРИДОН САНДОЗ	Новартіс Лтд., Бангладеш	табл., в криті п/о	4 мг	№ 20, № 50	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕРИДОН-АПО	Апотекс Інк., Канада	табл., в криті п/о	2 мг	№ 20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о	0,5 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	1 мг	№ 60	19.67	2,48\$
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	4 мг	№ 60	16.40	2,07\$
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у фл.	6 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/о у флак. у бліст.	2 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	табл., в/оу фл., у бл.	2 мг	№ 20	14.90	1,88\$
РИСПЕТРИЛ	Фармасайнс Інк., Канада	р-н для перорального застосування у флак. у к-ті з дозатором	1 мг/мл	№ 1	40.79	5,13\$
РИСПОЛЕПТ КОНСТА™	Янссен-Сілаг АГ, Швейцарія на заводі Алкермес Контролд Терапевтикс ІІ, США, Швейцарія/США	пор. для сусп. пролонг. для в/м ін'єкцій у флак. у к-ті з розчинником	25 мг	№ 1	163.65	20,56\$
РИСПОЛЕПТ КОНСТА™	Янссен-Сілаг АГ, Швейцарія на заводі Алкермес Контролд Терапевтикс ІІ, США, Швейцарія/США	пор. для сусп. пролонг. для в/м ін'єкцій у флак. у к-ті з розчинником	37,5 мг	№ 1	145.75	18,31\$
РИСПОЛЕПТ КОНСТА™	Янссен-Сілаг АГ, Швейцарія на заводі Алкермес Контролд Терапевтикс ІІ, США, Швейцарія/США	Пор. для сусп. пролонг. для в/м ін'єкцій у флак. у к-ті з розчинником	50 мг	№ 1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОЛЕПТ®	Янссен - Сілаг С.п.А., Італія	табл., в/о	1 мг	№ 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОЛЕПТ®	Янссен - Сілаг С.п.А., Італія	табл., в/о	2 мг	№ 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОЛЕПТ®	Янссен Фармацевтика Н.В., Бельгія	р-н для перорального застосування у фл.	1 мг/мл		65,99	8,29\$
РИСПОЛЕПТ® КВІКЛЕТ	Янссен - Сілаг С.п.А., Італія	табл., що дисперг. в рот. порожн.	2 мг	№ 28	45.26	5,70\$
РИСПОН	Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл., в криті п/о	1 мг	№ 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОН	Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл., в криті п/о	2 мг	№ 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОН	Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл., в криті п/о	2 мг	№ 20	4.96	0,63\$

РИСПОН	Інтас Фармасьютикалс Лтд, Індія	табл., в криті п/о	3 мг	№ 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОНД	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., в/о	1 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОНД	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., в/о	2 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИСПОНД	Мікро Лабс Лімітед, Індія	табл., в/о	4 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	1 мг	№ 20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	1 мг	№ 60 (10x6)	9.99	1,26\$
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	2 мг	№ 60 (10x6)	8,66	1,09\$
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	2 мг	№ 20 (10x2)	10.00	1,26\$
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	3 мг	№ 20	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	3 мг	№ 60 (10x6)	6.88	0,87\$
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	4 мг	№ 60 (10x6)	6.16	0,77\$
РИССЕТ®	ПЛІВА Хрватска д.о.о., Хорватія	табл., в криті п/о у бл.	4 мг	№ 20 (10x2)	7.00	0,88\$
РІЛЕПТИД®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/оу бліст.	1 мг	№ 10, № 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІЛЕПТИД®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/оу бліст.	2 мг	№ 10, № 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІЛЕПТИД®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/оу бліст.	3 мг	№ 10, № 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
РІЛЕПТИД®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	табл., в/оу бліст.	4 мг	№ 10, № 20, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СІЗОДОН 1	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о	1 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СІЗОДОН 2	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о	2 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СІЗОДОН 3	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о	3 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
СІЗОДОН 4	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в/о	4 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., в криті п/о.	1 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., в криті п/о	2 мг	№ 20, № 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., в криті п/о	3 мг	№ 20, № 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., в криті п/о	4 мг	№ 20, № 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	р-н для пер ос зас-ня у фл.	1 мг/мл	№1	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО® Q-TAB®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., що дисперг. в рот.порожн.	0,5 мг	№ 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО® Q-TAB®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., що дисперг. в рот.порожн.	1 мг	№ 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	
ТОРЕНДО® Q-TAB®	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	табл., що дисперг. в рот.порожн.	2 мг	№ 30, № 60	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Паліперидон (Paliperidone)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AX13 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антагоніст D₂-рецепторів, що передбачає послаблення позитивних симптомів шизофренії, викликає зменшення каталепсії та зниження моторних функцій меншою мірою, ніж традиційні нейролептики. Міцно зв'язується з серотоніновими 5-HT₂ та дофаміновими D₂-рецепторами, антагоніст альфа₁- та альфа₂-адренергічних рецепторів та Н₁-гістамінових рецепторів. Фармакологічна активність (+) та (-)-енантіомерів паліперидону однакова в якісному та кількісному відношенні. Центральний антагонізм до серотоніну може зменшувати схильність паліперидону до екстрапірамідних побічних дій.

Показання для застосування ЛЗ: лікування шизофренії, загострень шизофренії^{БНФ}, та профілактика загострень.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі (старше 18 років) - рекомендована доза складає 6 мг 1 р/добу, вранці незалежно від прийому їжі, внутрішньо^{БНФ}; поступове збільшення початкової дози не потрібне; у деяких пацієнтів

терапевтичний ефект спричиняє більш низька або більш висока доза в межах рекомендованого діапазону 3 - 12 мг 1 р/добу^{БНФ}; зміна дози, за наявності показань, повинна відбуватися після ретельної повторної оцінки стану пацієнта. Якщо показане підвищення дози, рекомендується збільшення на 3 мг/день і, як правило, відбувається з інтервалом більше 5 дн^{БНФ}.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний біль, тахікардія, акатизія, синусова тахікардія, екстрапірамідні симптоми, сонливість, запаморочення, седатія, тремор, гіпертензія, дистонія, ортостатична гіпотензія, сухість у роті, гіперсалівація, блювання, дискінезія, паркінсонізм; АР; підвищений апетит; жажливі сновидіння; постуральні запаморочення, великий епілептичний напад, непритомність; ністагм; атриовентрикулярна блокада 1-го ст., блокада ніжок пучка Гіса, брадикардія, відчуття серцебиття, синусова аритмія, гіпотензія, ішемія; біль у верхньому відділі живота; м'язова ригідність; аменорея, виділення з сосків, зміна менструального циклу, еректильна дисфункція, галакторея, гінекомастія; астенія, втома, набряки; зміни результатів різних тестів - ЕКГ - аномалії, збільшення маси тіла.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіпергіперчутливість до активної речовини або будь-якого допоміжного компоненту препарату.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 6 мг

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ІНВЕГА	Янссен - Сілаг С.п.А./Алза Корпорейшн/Янссен-Сілаг Ману фекчу ринг ЛЛС, Італія/США/США	табл. прол. дії, в/о	3 мг	№ 28	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ІНВЕГА	Янссен - Сілаг С.п.А./Алза Корпорейшн/Янссен-Сілаг Ману фекчу ринг ЛЛС, Італія/США/США	табл. прол. дії, в/о	6 мг	№ 28	51.16	6,43\$
	ІНВЕГА	Янссен - Сілаг С.п.А./Алза Корпорейшн/Янссен-Сілаг Ману фекчу ринг ЛЛС, Італія/США/США	табл. прол. дії, в/о	9 мг	№ 28	47.37	5,95\$

• **Галоперидол (Haloperidol) ***^[П]

Фармакотерапевтична група: N05AD01 - антипсихотичні засоби. Похідні бу тирофенону.

Основна фармакотерапевтична дія: препарат має нейролептичну, антипсихотичну, седативну, анальгезуючу, протисудомну, жарознижувальну, антигістамінну та протиблювотну дії; блокує постсинаптичні дофамінергічні рецептори у мезолімбічній системі, гіпоталамусі, тригерній зоні блювотного центру, екстрапірамідній системі; пригнічує центральні альфа-адренергічні рецептори; усуває марення, галюцинації, манії, впливає на вегетативні функції (знижує тонуc порожнистих органів, моторику і секрецію ШКТ, усуває спазми судин) при захворюваннях, що супроводжуються збудженням, неспокоєм, страхом смерті; ефективний у пацієнтів, резистентних до інших нейролептиків.

Показання для застосування ЛЗ: г. психомоторне збудження різного генезу^{ВООЗ, БНФ} (маніакальна фаза психозу^{БНФ}, деменція, олігофренія, психопатія, г. і хр. шизофренія,^{ВООЗ, БНФ} ажитована депресія, алкоголізм), марення і галюцинації при шизофренії^{БНФ}, параноїдних станах, г. психозах^{БНФ}; блювання і гикавка^{БНФ}, що тривало зберігаються та стійкі до терапії; премедикація перед оперативним втручанням, хорея Гентингтона, збудження, агресивність, розлади поведінки^{БНФ}; синдром Жиль де ла Туретта^{БНФ}.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: г. психози: дорослі - з помірними симптомами вводять 2 - 10 мг в/м^{БНФ} За необхідності наступну дозу можна вводити повторно кожні 4-8 годин до отримання бажаного терапевтичного ефекту. МДД 18 мг.^{БНФ} Сильний психоз - початкова доза до 18 мг, можна вводити в/в зі швидкістю не більше 10 мг/хв. стійке блювання або гикавка-по 1 - 2 мг в/м^{БНФ}, пероральна початкова доза становить 1,5-5 мг 2-3 р/д^{БНФ}, при необхідності підвищують до 15 мг (по 5 мг 3 р/д). Тривалість лікування становить 2 - 3 міс. Знижують поступово, підтримуюча доза - 5 - 10 мг/добу. Доза для дітей в віком від 3 до 12 р. становить при психотичних порушеннях від 0,05 мг на 1кг маси тіла/добу до 0,15 мг на 1 кг маси тіла/добу і при непсихотичних порушеннях поведінки і синдромі Турета від 0,05 мг на 1кг маси тіла/добу до 0,75 мг на 1 кг маси тіла/добу, розподілені на 2 - 3 прийоми^{БНФ}, але не більше ніж по 10 - 20 мг 3 р/добу.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тремор, ригідність, надмірне відділення слини, брадиканія, акатизія, г. дистонія, окулогірний криз, дистонія гортані; пізн. дискінезія; розлади зору, затуманення/нечіткість зору, катаракта, ретинопатія; нудота, втрата апетиту, запор і диспепсія; гіперпролактинемія, що може бути причиною галактореї, гінекомастії та оліго- або аменореї; тахікардія й дозозалежна гіпотензія; сухість у роті, нечіткий зір, затримка сечовипускання, надлишкова пітливість; набряк, шкірний висип та різні шкірні реакції, включаючи кропив'янку, екзофоліативний дерматит, мультиформна еритема.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до компонентів препарату; захворювання нервової системи, що супроводжуються екстрапірамідною симптоматикою, істерія, кома, тяжке токсичне пригнічення ЦНС, спричинене ЛЗ; хвороба Паркінсона, застосування у пацієнтів із серцевими розладами, порушенням серцевої провідності, подовженні інтервалу QT, наявністю в анамнезі шлуночкової аритмії або аритмії *torsades de pointes*, брадикардія або блокада II чи III ступеня, неконтрольована гіпокаліємія; вагітність і лактація (за необхідності усунення г. психомоторного збудження годування груддю припиняють); дит вік до 3-х років.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	"ГАЛОПРИЛ"	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", м. Харків, Україна	р-н д/ін'єкц. в амп.	0,5 %	№ 10, № 5x2	відсутня у реєстрі ОВЦ	

II.	ГАЛОМОНД	Діамонд Фарма (компанія Алашкар), Сірійська Арабська Республіка	р-н д/ін'єкц. в амп.	5 мг/мл	№ 5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГАЛОПЕРИДОЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	р-н д/ін'єкц. в амп.	5 мг/мл	№5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГАЛОПЕРИДОЛ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	р-н д/ін'єкц. в амп.	1,5 мг	№ 50	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГАЛОПЕРИДОЛ	Еlegant Індія, Індія	р-н д/ін'єкц. в амп.	5 мг/мл	№10	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГАЛОПЕРИДОЛ ДЕКАНОАТ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	р-н д/ін'єкц. в амп.	5 мг/мл	№ 5	відсутня у реєстрі ОБЦ
	ГАЛОПЕРИДОЛ ФОРТЕ	ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина	табл.	5 мг	№ 50	відсутня у реєстрі ОБЦ
	СЕНОРМ	Сан Фармасьютікал Індастріз Лтд., Індія	табл.у стрипах	1,5 мг	№ 100 (10x10)	відсутня у реєстрі ОБЦ
	СЕНОРМ	Сан Фармасьютікал Індастріз Лтд., Індія	табл.у стрипах	5 мг	№ 100 (10x10)	відсутня у реєстрі ОБЦ

• **Аріпіпразол (Aripiprazole)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AX12 - антипсихотичний засіб (нейролептик)

Основна фармакотерапевтична дія: терапевтична дія при шизофренії обумовлена сполученням часткової агоністичної активності відносно D2 дофамінових і 5HT1a серотонінових рецепторів і антагоністичною активністю відносно 5HT2 серотонінових рецепторів; має високу афінність in vitro до D2 і D3 дофамінових рецепторів, 5HT1a і 5HT2a серотонінових рецепторів та помірну афінність до D4 дофамінових, 5HT2c і 5HT7 серотонінових рецепторів, альфа1-адренорецепторів та H1 гістамінових рецепторів; характеризується помірною афінністю до ділянок зворотнього захоплення серотоніну та відсутністю афінності до мускаринових рецепторів; виявляє антагонізм в відносно дофамінергічної гіперактивності та агонізм відносно дофамінергічної гіпоактивності.

Показання для застосування ЛЗ: лікування г. нападів шизофренії БНФ та для підтримуючої терапії у пацієнтів з шизофренією БНФ; лікування г. маніакальних епізодів БНФ біполярного розладу I типу і для підтримуючої терапії в пацієнтів з біполярним розладом I типу, котрі перед цим перенесли маніакальний або змішаний епізод БНФ.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при шизофренії рекомендується призначати у початковій дозі 10-15 мг 1 р/д БНФ, незалежно від прийому їжі; підтримуюча доза складає 15 мг/добу БНФ; у клінічних дослідженнях показана ефективність препарату в дозах 10 - 30 мг/добу; при маніакальних епізодах при біполярному розладі слід приймати 1 р/добу незалежно від прийому їжі, починаючи з дози 15 мг/добу БНФ або 30 мг/добу БНФ; зміну дози, за необхідності, слід проводити з інтервалом не менше 24 год; продемонстрована ефективність препарату в дозах 15-30 мг/добу при маніакальних епізодах при прийомі протягом 3-12 тижнів; безпека доз вище 30 мг/добу у клінічних дослідженнях не оцінювалася; при спостереженні за пацієнтами з біполярним розладом I типу і маніакальними або змішаними епізодами, у яких не було симптомів на фоні прийому аріпіпразолу (15 мг/добу або 30 мг/добу при початковій дозі 30 мг/добу) протягом 6 тижнів, таку підтримуючу терапію слід вважати ефективною; варто періодично обстежувати пацієнтів для визначення необхідності продовження підтримуючої терапії; не потрібна зміна дозування препарату при призначенні його пацієнтам з нирковою / печінковою недостатністю (клас А, В і С по класифікації Чайлда-Пью)

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: непритомність, вазоагальний с-м, розширення серця, тріпотіння передсердь, тромбоз, тромбоз вен, флебіт, екстрасистолія, ортостатична гіпотензія, тахикардія; підвищення активності (АЛТ), і (АСТ), езофагіт, кровотеча ясен, запалення язика, криваве блювання, кишкові кровотечі, виразка ДПК, хейліт, гепатит, збільшення печінки, панкреатит, перфорація кишечника, збільшення апетиту, гастроентерит, утруднене ковтання, метеоризм, гастрит, зубний карієс, гінгівіт, шлунково-стравохідний рефлюкс, шлунково-кишкові крововиливи, періодонтальний абсцес, набряк язика, нетримання калу, коліт, ректальні крововиливи, стоматит, виразки в роті, холецистит, фекалома, кандидоз слизової оболонки рота, жовчокам'яна хвороба, відрижка, виразка шлунка, диспепсія, блювання, закреп, нудота, втрата апетиту; анафілаксія, ангіоневротичний набряк, свербіж і кропив'янка; збільшення активності креатинфосфокінази, рабдоміоліз, тенденіт, тендобурсит, РА, міопатія, біль у суглобах і кістах, міастенія, артрит, артроз, м'язова слабкість, спазми, бурсит, міалгія, судоми; марення, ейфорія, буккоглоссальний с-м, акінезія, пригнічення свідомості аж до втрати свідомості, знижені рефлексії, нав'язливі думки, зловмисний нейролептичний с-м, дистонія, м'язові посмикування, ослаблення концентрації уваги, парестезія, тремор кінцівок, імпотенція, брадикардія, знижене/підвищене лібідо, панічні реакції, апатія, дискінезія, ослаблення пам'яті, ступор, амнезія, інсульт, гіперактивність, деперсоналізація, с-м «неспокійних ніг» (акатизія), міоклонус, пригнічений настрій, підвищені рефлексії, уповільнення розумової функції, підвищена чутливість до подразників, гіпотонія, порушення оокорухової реакції, запаморочення, тремор, екстрапірамідний с-м, психомоторне порушення, депресія, нервозність, підвищене слиновиділення, ворожість, суїцидальні думки, маніакальні думки, нетверда хода, сплутаність свідомості, опір виконанню пасивних рухів, безсоння, сонливість, акатизія; кровохаркання, аспіраційна пневмонія, посилене виділення мокротиння, сухість слизової оболонки носа, набряк легень, емболія легеневої артерії, гіпоксія, ДН, апное, БА, носова кровотеча, гикавка, ларингіт, задихка, пневмонія; макулопапульозні висипи, ексфолиативний дерматит, кропив'янка, акне, везикулопульозні висипи, екзема, алопеція, псоріаз, себорея, сухість шкіри, свербіж, підвищена пітливість, шкірні виразки, посилене слюзотеча, часте миготіння, зовнішній отит, амбліопія, глухота, диплопія, очні крововиливи, фотофобія, сухість ока, біль в очах, дзвін у вухах, запалення середнього вуха, катаракта, втрата смаку, блефарит, кон'юнктивіт, біль у вухах; біль у молочній залозі, цервіцит, галакторея, аноргазмія, печіння в області сечостатевої системи, глікозурія, гінекомастія (збільшення молочних залоз у чоловіків), СКХ, болісна ерекція, цистит, прискорене сечовипускання, лейкорея, затримка сечовипускання, гематурія, дизурія, аменорея, передчасна еякуляція, піхвова кровотеча, вагінальний кандидоз, ниркова недостатність, маткова кровотеча, менорагія, альбумінурія, камені в нирках, ніктурія, поліурія, позив и до сечовипускання, нетримання сечі; біль в горлі, скутість у спині, тяжкість у голові, кандидоз, скутість в горлі, с-м Мендельсона, тепловий удар, біль в області таза, набряк обличчя, світлочутливість, щелепні болі, озноб, скутість щелеп, здуття живота, відчуття напруження в грудях, грипоподібний с-м, периферичний набряк, болі в

грудній клітці, у шиї; гіперкаліємія, подагра, гіпернатріємія, ціаноз, закислення сечі, гіпоглікемічна реакція, зневоднювання, набряк, гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гіпокаліємія, ЦД, підвищений рівень АЛТ, гіперліпідемія, гіпоглікемія, спрага, підвищення вмісту сечовини в крові, гіпонатріємія, підвищений рівень АСТ, підвищення лужної фосфатази, залізодефіцитна анемія, підвищений креатинін, білірубінемія, підвищений рівень ЛДГ, ожиріння, втрата ваги, підвищення рівня КФК

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; вік до 18 років.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 15 мг.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	АРИП МТ	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. у стрипах	10 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИП МТ	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. у стрипах	10 мг	№ 30	5.27	0,66\$
	АРИП МТ	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. у стрипах	15 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АРИП МТ	Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія	табл. у стрипах	15 мг	№ 30	5.27	0,66\$

• **Сертиндол (Sertindol)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AE03 - селективні антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: нейрофармакологічний профіль антипсихотичної дії сертиндолу обумовлений селективною блокадою мезолімбічних дофамінергічних нейронів та збалансованим інгібіторним впливом на центральні дофамінові D2 та серотонінові 5HT2-рецептори, так само як і на α 1-адренергічні рецептори; на тваринах пригнічував спонтанно-активні дофамінові нейрони в мезолімбічній вентральній ділянці мозку з коефіцієнтом селективності більше 100 порівняно з дофаміновими нейронами в substantia nigra pars compacta (SNC); інгібіція активності SNC вважається задіяною у виникненні рухових побічних ефектів (РПЕ) багатьох антипсихотичних засобів; відомо, що антипсихотичні препарати підвищують рівень пролактину в плазмі завдяки дофаміновій блокаді; рівень пролактину у пацієнтів, які приймають сертиндол, залишається у межах норми, як протягом короткого, так і довготривалого (1 р.) курсу лікування; не впливає на м-холінорецептори та гістамінові H1-рецептори.

Показання для застосування ЛЗ: шизофренія;

Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначається per os 1 р/д, незалежно від прийому їжі; для седативної дії одночасно може бути призначений бензодіазепін; лікування всіх пацієнтів повинно починатися з дози сертиндолу 4 мг/добу; доза підвищується шляхом додавання по 4 мг кожні 4 - 5 діб доки оптимальна добова підтримуюча доза в інтервалі 12 - 20 мг не буде досягнута; завдяки активності сертиндола як α 1-блокатора, протягом початкового періоду титрації дози можуть спостерігатися симптоми постуральної гіпотензії; початкова доза 8 мг або прискорене підвищення дози значно збільшують ризик постуральної гіпотензії; залежно від індивідуальної чутливості пацієнта, доза може бути підвищена до 20 мг/добу; тільки у виняткових випадках може бути призначена максимальна доза - 24 мг, оскільки у ході клінічних випробувань не виявлено більшої ефективності доз понад 20 мг, і пролонгація інтервалу QT може збільшуватися в межах найвищих доз; АТ пацієнтів має контролюватися протягом періоду добирання дози та на початку підтримуючої терапії; пацієнти, які мали перерву у прийомі сертиндолу менш ніж один тиждень, не потребують повторного добирання дози, а їхня підтримуюча доза може бути відновлена; в інших випадках необхідно дотримуватися рекомендованого методу добирання дози; перед повторною титрацією сертиндолу має бути зробленою ЕКГ; лікування сертинделом можна розпочати згідно з рекомендованою послідовністю добирання дози після припинення прийому інших пероральних антипсихотиків; пацієнтам, які приймали ін'єкції депонованих антипсихотиків, сертиндол призначається замість наступної ін'єкції депо.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: риніт/закладений ніс, порушення еякуляції (знижений еякуляторний об'єм), запаморочення, сухість у роті, постуральна гіпотензія, збільшення маси тіла, периферичні набряки, диспное, парестезії та пролонгація інтервалу QT; постуральна гіпотензія; гіперглікемія; запаморочення, парестезії, синкопе, судоми, рухові розлади (особливо пізня дискінезія), злоякісний нейролептичний с-м, периферичний набряк, аритмія типу Torsade de Pointes; диспное; сухість у роті; збільшення маси тіла, пролонгація інтервалу QT, поява еритроцитів та лейкоцитів у сечі.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якої складової препарату; встановлена некоригована гіпокаліємія, а також гіпомагніємія; в анамнезі клінічно значущі СС захворювання (застійну СН, кардіогіпертрофію, аритмію або брадикардію (< 50 у д/хв)); с-м спадкового подовженого інтервалу QT або сімейний анамнез цієї хвороби; надбаний пролонгований інтервал QT (QTс понад 450 мсек у чоловіків та 470 мсек у жінок); ураження печінки тяжкого ступеня.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 16 мг.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	СЕРДОЛЕКТ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл., в/о	4 мг	№ 30	40.56	3,89€
	СЕРДОЛЕКТ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл., в/о	12 мг	№ 28	40.56	3,89€
	СЕРДОЛЕКТ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл., в/о	16 мг	№ 28	40.56	3,89€
	СЕРДОЛЕКТ	Х. Лундбек А/С, Данія	табл., в/о	20 мг	№ 28	38.55	3,70€

• **Сультірид (Sulpiride)** [7]

Фармакотерапевтична група: N05AL01 - антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: впливає на дофамінергічну нервову передачу в головному мозку як допаміноміметик, завдяки чому справляє активуючу дію. У високих дозах має антирепродуктивну дію. швидко

розподіляється в тканинах організму: видимий об'єм розподілу у стаціонарному стані становить 0,94 л/кг. виводиться в основному нирками шляхом клубочкової фільтрації. Його нирковий кліренс становить 126 мл/хв.

Показання для застосування ЛЗ: Г. психічні розлади. Хр. психічні розлади (шизофренія^{БНФ}, хр. порушення нешизофренічного характеру: параноїдальні стани, хр. галюцинаторний психоз). Серйозні поведінкові розлади (ажитация (тривожне збудження), самопошкодження, стереотипія) у дітей віком від 6 р., особливо у пацієнтів з аутичними синдромами.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: шизофренія^{БНФ} - призначений лише для дорослих, ДД - 200^{БНФ} -1000 мг, короткотривале симптоматичне лікування тривожних станів у випадках, коли звичайні терапевтичні заходи не дали результатів: ДД 50-150 мг протягом не більше 4 тижн. В/м - лише для дорослих. Якщо клінічний стан пацієнта дозволяє, лікування має розпочинатися з низької дози (100 мг), після чого можливе поступове титрування дози. Доза становить 400 до 800 мг/добу^{БНФ} протягом 2 тижн. Діти віком від 6 років. 5 мг/кг маси тіла/добу (за необхідності ця доза може бути збільшена до 10 мг/кг маси тіла/добу).

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: рання дискінезія, гіпокінезія та гіперсалівація; екстрапірамідний с-м: акінетичні симптоми, що супроводжуються або не супроводжуються гіперкінезом, які частково зменшуються при застосуванні антихолінергічних а/паркінсонічних агентів, гіперкінетична-гіпертонічна, збудлива рухова активність, акатизія; пізня дискінезія, заспокійливий ефект або сонливість; судоми; потенційно летальний злоякісний нейролептичний с-м; короткочасна гіперпролактинемія, що зникає після відміни лікування, яка може призводити до аменореї, галактореї, гінекомастії, імпотенції, фригідності, збільшення молочних залоз та біль у молочних залозах; збільшення маси тіла; подовження QT-інтервалу, шлуночкові аритмії, зокрема пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует» (torsades de pointes), шлуночкова тахікардія, яка може призвести до фібриляції шлуночків або зупинки серця, раптова смерть; постуральна гіпотензія; збільшення активності ферментів печінки; макулопапулярний висип.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; пролактинзалежні пухлини (наприклад, пролактинсекретуюча аденома гіпофіза (пролактинома) та рак мол. залози); відомий або підозрюваний д-з феохромоцитоми.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,8 г, парентерально - 0,8 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., в криті п/о	50 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., в криті п/о	100 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	БЕТАМАКС	АТ "Гріндекс", Латвія	табл., в криті п/о	200 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕГЛОНІЛ	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл., в криті п/о	200 мг	№ 12x1, № 12x5	18.77	1,61€
	ЕГЛОНІЛ	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	капс.	50 мг	№ 15x2	40.94	3,50€
	ЕГЛОНІЛ	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	р-н для ін'єкцій	100 мг/2 мл	№ 6	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	ЕГЛОНІЛ	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	р-н для ін'єкцій	100 мг/2 мл	№ 6	47.82	8,18€
	РЕСТФУЛ	Фармацевтична лабораторія "БРОС ЛТД", Греція	р-н для ін'єкцій	100 мг/2 мл	№ 6, № 30	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУЛЬПІРИД	"ПЛІВА Краків" Фармацевтичний Завод АТ, Польща	капс.	50 мг	№ 24 (12x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУЛЬПІРИД	"ПЛІВА Краків" Фармацевтичний Завод АТ, Польща	капс.	100 мг	№ 24 (12x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СУЛЬПІРИД	"ПЛІВА Краків" Фармацевтичний Завод АТ, Польща	табл.	200 мг	№ 12 (12x1), № 30 (15x2)	відсутня у реєстрі ОВЦ	

• **Амісульпід (Amisulpride)**^[7]

Фармакотерапевтична група: N05AL05 - Антипсихотичні засоби.

Основна фармакотерапевтична дія: антипсихотичний засіб, що належить до класу заміщених бензамідів; блокує пресинаптичні D2/D3-рецептори, що пояснює його дію на негативні симптоми шизофренії, полегшує вторинні негативні симптоми захворювання значно більшою мірою, ніж галоперидол; з високою спорідненістю зв'язується з субтипами D2/D3 дофамінергічних рецепторів; не має спорідненості з рецепторами серотоніну, гістаміну, з адренергічними і холінергічними рецепторами, блокує переважно дофамінергічні нейрони, що локалізуються в мезолімбічних структурах, а не в стріарній системі, ця специфічна спорідненість пояснює переважно антипсихотичну дію.

Показання для застосування ЛЗ: лікування психозів^{БНФ}, особливо г. або хр. шизофренічних порушень^{БНФ}, що супроводжуються позитивними симптомами - марення, галюцинації, розлади мислення і/або негативними симптомами - афективна тупість, відсутність емоційності та уникання спілкування, в тому числі у пацієнтів з переважно негативною симптоматикою.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: якщо добова доза не перевищує 400 мг, препарат слід приймати 1 р/добу; дозу більше 400 мг слід розділити на 2 прийоми на добу; для пацієнтів з переважно негативною симптоматикою доза становить від 50 до 300 мг на добу^{БНФ}, для пацієнтів зі змішаними негативними та позитивними симптомами дози необхідно підбирати так, щоб забезпечити контроль позитивних симптомів, тобто 400 - 800 мг/добу^{БНФ}; підтримуюча

доза повинна встановлюватися індивідуально, на рівні мінімально ефективних доз; при г. психотичних епізодах рекомендована початкова доза становить 400 - 800 мг^{БНФ}, МДД - не більше 1 200 мг^{БНФ}; підтримуюча доза повинна встановлюватися індивідуально, на рівні мінімально ефективних доз.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: безсоння, тривого, ажитація, екстрапірамідні симптоми; частота екстрапірамідних симптомів залежить від дози препарату та дуже низка у хворих, які приймають 50 - 30 мг/добу для усунення переважно негативних симптомів; частота виникнення екстрапірамідних симптомів нижче у хворих, які приймають, ніж у хворих, які приймають галоперидол; денна сонливість; г. дистонія; пізня дискінезія звичайно до випадків тривалого застосування препарату; конвульсії; злоякісний нейролептичний с-м; оборотне після відміни препарату підвищення рівня пролактину в сироватці, що може спричинити галакторею, аменорею, гінекомастію, набрякання молочних залоз, імпотенцію та ригідність, збільшення маси тіла; запор, нудота, блювання, сухість у роті; гіпотензія та брадикардія, подовження інтервалу QT на ЕКГ, тахіаритмія "torsades de pointes"; печінка - підвищення рівня ферментів печінки, особливо трансаміназ; АР.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату; діагностована або підозрювана феохромоцитома; діти до 15 р.; вагітність, лактація; діагностовані або підозрювані пролактинзалежні пухлини, наприклад пролактинома гіпофіза та РМЗ; тяжка НН.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,4 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	СОЛЕРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл.	100 мг	№ 10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛЕРОН 100	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл.	100 мг	№ 30	26.40	
	СОЛЕРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл.	200 мг	№ 10	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛЕРОН 200	ТОВ "Фарма Старт", м.Київ, Україна	табл.	200 мг	№ 30	23.33	
II.	СОЛІАН	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл.в/о у бл.	400 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛІАН	Юнітер Ліквід Ману фекчу рінг, Франція	р-н д/перор. застосування у фл. по 60 мл	100 мг/1 мл	№ 1	35.39	3,03€
	СОЛІАН 100 мг	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл. у бл.	100 мг	№ 30 (10x3)	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛІАН 200 мг	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл. у бл.	200 мг	№ 30 (10x3) у бл.	відсутня у реєстрі ОВЦ	
	СОЛІАН 200 мг	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл. у бл.	200 мг	№ 30 (10x3)	38.14	3,26€
	СОЛІАН 200 мг	Санофі Вінтроп Індастрія, Франція	табл. у бл.	200 мг	№ 30 (10x3)		

5.1.3. Антидепресанти

- **Іміпрамін (Imipramine)** [7]

Фармакотерапевтична група: N06AA02 - антидепресанти. Неселективні інгібітори зворотного захоплення моноамінів

Основна фармакотерапевтична дія: тимолептичну дія, покращує настрій, зменшує почуття суму, має центральну та периферичну м-холіноблокувальну, міотропну (спазмолітичну), помірну антигістамінну активність; похідний продукт дибензоазепіну; належить до групи препаратів, що називаються трициклічними антидепресантами; здійснює тимолептичну дію, покращує настрій, зменшує почуття суму; має супровідну стимулювальну активність, викликає зменшення рухової загальмованості, підвищує психічний та загальний тонус організму; виявляє центральну та периферичну м-холіноблокувальну, міотропну (спазмолітичну), помірну антигістамінну активність.

Показання для застосування ЛЗ: при всіх формах депресії^{БНФ} (з тривожністю чи без неї): глибокій депресії, в депресивній фазі біполярного розладу, депресії з атипичним перебігом, депресивних станах, дистимії); при панічному розладі; при нічному енурезі^{БНФ} (у дітей віком від 6 років): як засіб тимчасової допоміжної терапії, якщо органічні причини виключені; при астенодепресивному с-мі, що супроводжується моторною та ідеаторною загальмованістю, ендогенній, інволюційній, клімактеричній, реактивній, алкогольній депресіях, депресивних станах при психопатіях та неврозах.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: добові дози слід визначати індивідуально, залежно від важкості та природи симптомів; як і в випадку інших антидепресантів, для досягнення адекватного терапевтичного ефекту потрібен, щонайменше, 2-4-тижневий курс лікування; у деяких випадках потрібен курс тривалістю 6-8 тижнів; рекомендовано починати лікування з низьких доз препарату й поступово підвищувати добову дозу до досягнення підтримуючої дози; у процесі лікування потрібно також визначити найнижчу дозу, що справляє ефект - обережність є виправданою при визначенні дози для літніх хворих і пацієнтів підліткового віку (тобто молодших за 18 років); при депресії у дорослих^{БНФ} лікування амбулаторних пацієнтів можна починати з добової дози 25 мг 1-3 р/добу^{БНФ}, цю дозу можна впродовж тижня поступово підвищити до 150-200 мг/добу^{БНФ}; підтримуюча доза становить 50-100 мг/добу; у важких госпіталізованих хворих можна починати з добової дози 75 мг/добу, цю дозу можна поступово підвищувати, додаючи щоразу по 25 мг, до досягнення добової дози 200 мг/добу; у дуже виняткових випадках добова доза може бути ще вищою - до 300 мг/добу; літні хворі (старші за 60 років) і підлітки (молодші за 18 років) можуть бути більш сприйнятливими до препарату та виявляти серйозні реакції в відповідь на стандартні дози для дорослих, тому лікування таких хворих слід починати з найнижчої дози, що спроможна контролювати симптоми; далі можна почати поступове підвищення дози, з досягненням добової дози в 50-75 мг; рекомендовано досягати оптимальної дози впродовж 10 днів і на такій дозі продовжувати лікування; пацієнти з панічним розладом більш схильні до розвитку побічних ефектів, і лікування потрібно починати з

найнижчої дози; минуші напади більш сильної тривожності, які можна спостерігати на самому початку терапії, можна контролювати за допомогою призначення похідних бензодіазепіну; цю допоміжну терапію можна поступово зняти в міру того, як симптоми тривожності зникають; добову дозу можна поступово підвищувати до межі 75-100 мг/добу (тільки у винятках - до 200 мг/добу); потрібен курс лікування тривалістю, щонайменше, 6 місяців; курс завершують шляхом поступового зняття препарату; для дітей рекомендовані такі схеми лікування - діти віком 6-8 років^{БНФ} (маса тіла 20-25 кг) - 25 мг/добу^{БНФ}; діти віком 9-12 років^{БНФ} (маса тіла 25-35 кг) - 25-50 мг/добу^{БНФ}; діти, старші за 12 років^{БНФ} (маса тіла > 35 кг) - 50-75 мг/добу^{БНФ}; якщо низька початкова доза не дає ефекту, для досягнення адекватного терапевтичного ефекту можна застосовувати більш високі дози, але в межах схеми, що обирається відповідно до віку дитини; при лікуванні дітей треба слідкувати за тим, щоб добова доза не перевищувала 2,5 мг/кг маси тіла/добу; у кожній схемі потрібно застосовувати найнижчу ефективну дозу зі вказаного інтервалу; добова доза може призначатися в один прийом перед сном; якщо ж енурез має місце рано ввечері, добову дозу рекомендовано розділити (одна частина дається дитині в день у післяобідній час, тоді як інша - перед сном); тривалість курсу лікування не повинна перевищувати 3 місяці^{БНФ}; підтримуючу дозу слід підбирати в міру того, як зменшується вираженість симптомів; перед повним зняттям препарату рекомендоване поступове зменшення добової дози; парентерально препарат застосовується для лікування хворих на депресію у стані сильного збудження чи тоді, коли пероральний спосіб не є можливим; лікар залежно від стану хворого може призначити введення р-ну для ін'єкцій тільки протягом короткого часу, а потім запропонувати перейти на приймання табл.; при тяжких депресіях в умовах стаціонару призначають по 25 мг (2 мл р-ну), 1 - 3 р/добу в/м; МДД при такому способі введення - 100 мг, далі лікування можна проводити за допомогою табл.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, постуральна гіпотензія, тахікардія та симптоми, схожі на дію атропіну (сухість у роті, констипація, затримка сечі, нечіткість зору, порушення акомодатії, підвищення t° та внутрішньоочного тиску); головний біль, периферична невротія, шум у вухах, тремор, атаксія, утруднення мови, особливо у людей похилого віку (слуханість свідомості, делірій); епілептогенний ефект - у першу чергу, у хворих на епілепсію або при схильності до конвульсій; аритмія, сильна гіпотензія та/або болісний вазоспазм, що проявляється в посинінні пальців; гепатит з порушенням функції печінки, пожовтінням шкіри та склер, біль, металевий присмак у роті, запалення внутрішньої слизової оболонки рота (стоматит), нудота, блювання та, у виняткових випадках - паралітична непрохідність кишок; шкірні АР (через 14 - 60 днів після початку лікування) - кропив'янка, ангіоедема, фоточутливість; збільшення молочних залоз, галакторея, ускладнення ЦД, зниження переносимості глюкози, зниження продукування антидіуретичного гормону; зниження лібідю, імпотенція, болісна еякуляція, порушення оргазму, у людей похилого віку, можуть при проведенні лабораторних досліджень виявлятися зміни показників крові.

Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність, лактація; алергія до іміпраміну або інших інгредієнтів, що входять до складу препарату, до інших трициклічних антидепресантів дибензоазепінового ряду; лікування інгібіторами моноаміноксидази; наявності в минулому серцевих нападів (ІМ) або нерегулярного скорочення серця (аритмії); тяжкого захворювання нирок та/або печінки; затримки сечі (гіпертрофія простати); наявності вузькокутової глаукоми; діти віком до 6 р.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	МЕЛІПРАМІН®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	р-н д/ін'єкцій	25 мг/2 мл	№ 10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	МЕЛІПРАМІН®	ВАТ Фармацевтичний завод ЕПС, Угорщина	драже	25 мг	№ 50	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Кломіпрамін (Clomipramine)** * [7]

Фармакотерапевтична група: N06AA04 - антидепресанти

Основна фармакотерапевтична дія: вплив на депресивний с-м у цілому, в тому числі на такі його типові прояви, як психомоторна загальмованість, пригнічений настрій і тривожність; лікувальна дія кломіпраміну здійснюється за рахунок його здатності інгібувати зворотне нейрональне захоплення норадреналіну (НА) і серотоніну (5-НТ), причому найважливішим є пригнічення зворотного захоплення серотоніну; лікувальна дія кломіпраміну здійснюється за рахунок його здатності інгібувати зворотне нейрональне захоплення норадреналіну (НА) і серотоніну (5-НТ), причому найважливішим є пригнічення зворотного захоплення серотоніну; кломіпрамін властивий широкий спектр інших фармакологічних дій: альфа1-адренолітична, антихолінергічна, антигістамінна та антисеротонінергічна (блокада 5-НТ-рецепторів); вплив на депресивний с-м у цілому, в тому числі здебільшого на такі його типові прояви, як психомоторна загальмованість, пригнічений настрій і тривожність; клінічний ефект відмічається звичайно через 2 - 3 тижні лікування; має також специфічний вплив при obsesивно-компульсивних розладах, який відрізняється від його антидепресивного ефекту; дія кломіпраміну при хр. больових с-мах, зумовлених або не зумовлених соматичними захворюваннями, пов'язана з полегшенням передачі нервового імпульсу, опосередкованої серотоніном і норадреналіном.

Показання для застосування ЛЗ: депресивні стани^{БНФ} різної етіології, що перебігають з різною симптоматикою - ендогенні, реактивні, невротичні, органічні, замасковані, інволюційні форми депресії; депресія у хворих на шизофренію і психопатії; депресивні с-ми, що виникають у старечому віці; депресивні стани, зумовлені хр. больовим с-мом або хр. соматичними захворюваннями, депресивні порушення настрою реактивної, невротичної або психопатичної природи; obsesивно-компульсивні с-ми; фобії^{ВООЗ, БНФ} і панічні розлади (напади)^{ВООЗ}; катаплексія, що супроводжує нарколепсію^{БНФ}; хр. больовий с-м; нічний енурез (тільки у пацієнтів старше 6 років і за умови виключення органічних причин захворювання).

Спосіб застосування та дози ЛЗ: тактика лікування полягає у досягненні оптимального ефекту на фоні застосування найменших доз препарату, а також в обережному їх збільшенні, особливо для пацієнтів похилого віку і підлітків, які більш чутливі до препарату, ніж пацієнти проміжних вікових груп; розпочинають лікування із в/м введення 25 - 50 мг (вміст 1 - 2 ампл.), потім щоденно підвищують дозу на 25 мг (1 ампл.) до досягнення добової дози 100 - 150 мг (4 - 6 ампл.); після того, коли буде відзначено поліпшення стану, число ін'єкцій поступово зменшують, замінюючи їх підтримуючою терапією, пероральними формами препарату; лікування можна розпочинати зв/в краплинного введення 50 - 75 мг (вміст 2 - 3 ампл.) 1 р/добу; для приготування інфузійного р-ну використовують 250 - 500 мл ізотонічного р-ну натрію хлориду або р-ну глюкози; тривалість інфузії 1,5 - 3 год; особливу увагу необхідно приділяти контролю АТ, оскільки може розвинути ортостатична гіпотензія; якщо вдалось досягнути чіткого покращання стану пацієнта, лікування за

допомогою інфузій слід продовжувати ще протягом 3 - 5 днів; потім для підтримання досягнутого ефекту переходять на прийом препарату в ну тришньо; 2 табл. по 25 мг еквівалентні 1 ампл., що містить 25 мг препарату; з метою поступового переходу від інфузійної терапії до підтримуючого перорального прийому препарату можна також спочатку перевести хворого на в/м введення; дітям парентеральне введення препарату не рекомендується.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: загальна слабкість, порушення сну, хвилювання, відчуття тривоги, запор, сухість у роті; сонливість, загальна слабкість, занепокоєння, підвищення апетиту, розгубленість, дезорієнтація, галюцинації (особливо у пацієнтів похилого віку та у пацієнтів з хворобою Паркінсона), відчуття тривоги, збудження, порушення сну, манакальний стан, гіпоманіакальний стан, агресивність, порушення пам'яті, деперсоналізація, посилення депресії, порушення концентрації уваги, безсоння, нічні кошмари, позіхання, активація симптомів психозу; запаморочення, тремор, головний біль, міоклонус, делірій, порушення мови, парестезії, м'язова слабкість, підвищення тону м'язів, судоми, атаксія; зміни на ЕЕГ, гіперпірексія; сухість у роті, пітливість, запори, порушення акомодатії, нечіткість зору, порушення сечовипускання, припливи, мідріаз, глаукома, затримка сечі; синусова тахікардія, серцебиття, ортостатична гіпотензія, клінічно незначущі зміни на ЕКГ (наприклад інтервал ST або зубця T) у пацієнтів, які не мають захворювань серця, аритмії, підвищення AT, порушення внутрішньосерцевої провідності (наприклад розширення комплексу QRS, збільшення інтервалу QT, зміни інтервалу PQ, блокада ніжок пучка Гіса, двонаправлена шлуночкова тахікардія, особливо у пацієнтів з гіпокаліємією); нудота, блювання, дискомфорт у животі, діарея, анорексія; підвищення рівня трансаміназ у крові, гепатит з жовтухою чи без неї; висип, кропив'янка, фотосенсибілізація, свербіж, набряки (місцеві або загальні), випадання волосся; збільшення маси тіла, порушення лібідо і потенції, галакторея, збільшення молочних залоз, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону; алергічний альвеоліт (пневмоніт) з еозинофілією або без неї, системні анафілактичні/анафілактоїдні реакції, включаючи гіпотензію; лейкопенія, агранулоцитоз, тромбозопенія, еозинофілія, пурпура; порушення смакових відчуттів, шум у вухах.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до клоніпраміну або будь-яких інших інгредієнтів препарату, пережесна підвищена чутливість до трициклічних антидепресантів групи дибензазепіну; одночасне застосування інгібіторів MAO, таких як моклобемід, а також період менше 14 днів до і після їх застосування; недавно перенесений ІМ; уроджений с-м подовженого інтервалу QT.

Визначена добова доза (DDD): перорально - 0,1 г, парентерально - 0,1 г.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	АНАФРАНІЛ®	Новартис Фарма С.п.А., Італія	табл., в/о	25 мг		6.91	0,87\$
	АНАФРАНІЛ®	Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцарія	р-н д/ін'єкцій	25 мг/2 мл	№ 10	36.68	4,60\$
	АНАФРАНІЛ®	Нікомед Австрія ГмбХ, Австрія	р-н д/ін'єкцій	25 мг/2 мл	№ 10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	КЛОФРАНІЛ	Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд., Індія	табл., в криті п/о	25 мг	№ 50 (10x5)	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Амітриптилін (Amitriptyline) *** [7]

Фармакотерапевтична група: N06AA09 - антидепресанти

Основна фармакотерапевтична дія: має виражену тимолітичну та седативну дію; справляє центральну седативну дію; виявляє центральну антихолінергічну та антигістамінну активність; належить до групи трициклічних антидепресантів; має виражену тимолітичну та седативну дію; справляє центральну седативну дію; виявляє центральну антихолінергічну та антигістамінну активність; механізм дії препарату полягає у пригніченні зворотного нейронального захоплення норадреналіну та серотоніну, що веде до накопичення цих медіаторів і посилення адренергічних і серотонінергічних ефектів; не інгібує MAO; підвищує патологічно знижений настрій; найбільш виражений ефект досягається при ендогенній депресії, але реакція на препарат досягається також і у пацієнтів з іншими депресивними станами; завдяки седативній дії амітриптилін має особливе значення при депресивних станах, які супроводжуються тривогою, збудженням і порушенням сну.

Показання для застосування ЛЗ: Тяжка депресія^{ВООЗ, БНФ}, особливо з характерними рисами тривоги, збудження та розладів сну.; депресивні стани^{ВООЗ, БНФ} у хворих на шизофренію в комбінації з нейролептиком для попередження заострення галюцинацій і параноїдної манії. ; хр.больовий с-м; нічний енурез за умов відсутності органічної патології.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: при депресії необхідно починати лікування з використанням низьких доз з поступовим їх збільшенням при постійному спостереженні за клінічним ефектом і переносимістю; дози вище 150 мг/добу призначають переважно госпіталізованим пацієнтам; дорослим спочатку 25 мг 3 р/добу^{ВООЗ, БНФ} з поступовим підвищенням, за необхідності, кожного наступного дня на 25 мг до рівня 150 мг^{ВООЗ, БНФ} (зрідка до 225-300 мг/добу в умовах стаціонару). (у деяких випадках - до 25 мг/добу госпіталізованим пацієнтам); додаткові кількості препарату призначають в основному у вечірній час; підтримуюча доза відповідає оптимальній терапевтичній; підліткам і пацієнтам старше 65 років - спочатку 10 мг 3 р/добу^{ВООЗ, БНФ} з поступовим підвищенням, за необхідності, кожного наступного дня до рівня 100 - 150 мг/добу^{ВООЗ, БНФ}; додаткові кількості препарату призначають в основному у вечірній час; підтримуюча доза відповідає оптимальній терапевтичній; лікування дітей допускається тільки в умовах стаціонару, для лікування енурезу у дітей дозу підбирають індивідуально; початкова доза - 1,5 мг/кг/добу з підвищенням кожного тижня на 1,5 мг/кг/добу до МДД - 5 мг/кг/добу; антидепресивний ефект розвивається протягом 2 - 4 тижнів; лікування антидепресантами носить симптоматичний характер і тому повинно проводитись протягом певного проміжку часу, як правило - до 6 місяців, з метою профілактики рецидиву після одужання; хворим на уніполярну депресію підтримуюча терапія може бути необхідною протягом кількох років для запобігання новим епізодам; тривалість курсу лікування та підтримуючу дозу визначають індивідуально для кожного пацієнта, з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого лікувального ефекту та переносимості препарату; при припиненні лікування препарат потрібно відмінити поступово, протягом кількох тижнів; при хр. болю дорослим - 25 мг на ніч; пацієнти похилого віку повинні починати лікування з половини вказаної вище рекомендованої дози; найвище дозування - дорослим 100 мг/добу; нічний енурезу дітей 7-12 років - 25 мг за 0,5-1 год перед сном; діти старше 12 років -

50 мг за 0,5-1 год перед сном; хр. больовий с-м у дорослих - спочатку 25 мг увечері, МДД - 100 мг увечері; збільшувати поступово з огляду на ефективність терапії; пацієнти похилого віку повинні починати лікування з приблизно половинної рекомендованої дози; при нічному ену режі дітям 7 - 12 років - 25 мг^{БНФ}, старшим 12 років - 50 мг^{БНФ} за 0,5 - 1 год до сну; тривалість терапії - не більше 3 місяців^{БНФ}; в/м вводять дозу 10, 20 або 30 мг до 4 р/добу, збільшення дози необхідно проводити поступово, МДД становить 150 мг, через 1-2 тижні ін'єкцій переходять на пероральне застосування препарату.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: тремор, запаморочення, головний біль, парестезія, атаксія; розлади акомодациї, мідріаз; сонливість, порушення орієнтації, послаблення концентрації, зниження лібідо; підвищена пітливість; сухість у роті, нудота, розлади смакових відчуттів; тахікардія, постуральна гіпотензія, зміни ЕКГ - збільшення QT, розширення ORS (блокада в ну трішньошлункової провідності), зміни в атріовентрикулярній провідності, атріовентрикулярна блокада; збільшення маси тіла, ожиріння; імпотенція у чоловіків.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; г. ІМ; будь-який ступінь серцевої блокади або розлади серцевого ритму та ІХС; сумісний прийом інгібіторів MAO; періоди вагітності та годування груддю.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
I.	АМІТРИПТИЛІН	ЗАТ "Технолог", м. Умань, Черкаська обл., Україна	табл., в/о у бл.	25 мг	№ 10, № 50	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", м. Харків, Україна	табл.	25 мг	№ 25, № 25x1	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД-ОЗ	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", м. Харків, Україна	р-н д/ін'єкцій	10 мг/мл	№ 10	відсутня у реєстрі ОБЦ	
II.	САРОТЕН	Х. Лундбек А/С, Данія	табл., в/о	25 мг	№ 100	відсутня у реєстрі ОБЦ	
	САРОТЕН РЕТАРД	Х. Лундбек А/С, Данія	капс.	25 мг	№ 100	відсутня у реєстрі ОБЦ	

• **Доксепін (Doxepin)**

Фармакотерапевтична група: N06AA12 - антидепресанти. Неселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінів.

Основна фармакотерапевтична дія: антидепресивна дія поєднується з анксиолітичною і седативною, також чинить антигістамінну, холінолітичну та α1-адреноблокуючу дії; належить до групи трициклічних антидепресантів; гальмує зворотне захоплення біогенних амінів (норадреналіну та серотоніну) в синаптичних структурах; не спричиняє ейфорії, психомоторного збудження.

Показання для застосування ЛЗ: невротичні розлади із симптомами депресії або тривоги; органічні неврози, асоційовані з безсонням; депресивні та тривожні стани при алкоголізмі; депресія та тривожні стани^{БНФ}, асоційовані із соматичними розладами та захворюваннями; депресія, що супроводжується страхом і тривогою на тлі психозів, включаючи інволюційну депресію та депресивну фазу біполярних розладів.

Спосіб застосування та дози ЛЗ: в ну трішньо призначають дорослим і дітям старше 12 років; доза становить 30 - 300 мг/добу^{БНФ}; дозу до 100 мг можна застосовувати як окрему одноразову або розділену; дози, що перевищують 100 мг, слід застосовувати у 3 прийоми^{БНФ}; Максимальна разова доза - 100 мг (застосовувати перед сном); при помірних або тяжких симптомах звичайна початкова доза становить 75 мг щоденно^{БНФ}; у більшості пацієнтів ця доза є задовільною; при тяжких формах захворювання добову дозу збільшують до 300 мг (у 3 прийоми); після досягнення задовільного терапевтичного ефекту дозу препарату коригують до мінімальної підтримуючої; протитривожний ефект доксепіну досягається раніше, ніж антидепресивний; антидепресивна дія проявляється через 2 - 3 тижні лікування; пацієнтам літнього віку з помірними симптомами рекомендується половина дози доксепіну; задовільні клінічні ефекти були отримані після застосування в дозі 30 мг/добу; пацієнтам із порушеннями функції печінки слід зменшувати дози.

Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: сонливість, безсоння, сухість слизових оболонок рота та носа, пітливість, лабільність АТ, тахі- або брадикардія, головний біль та запаморочення, схильність до запору, нудота та інші диспептичні явища; м'язові тремтіння у пацієнтів літнього віку та хворих на алкоголізм, порушення акомодациї, загальна слабкість, підвищена втомлюваність, збільшення маси тіла, озноб, алопеція, відчуття припливів до обличчя, загострення БА та гіперпірексія (у пацієнтів, які приймають хлорпромазин), у поодиноких випадках спостерігаються жовтяниця та шум у вухах; загальмованість або надмірна збудливість, дезорієнтація, сплутаність свідомості, парестезії, атаксія, екстрапірамідні симптоми; шкірні висипи, свербіж; еозинофілія та порушення функції кісткового мозку (агранулоцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія); зміни лібідо, набряка яєчок, гіперглікемія, порушення секреції антидіуретичного гормону, гінекомастія, збільшення грудних залоз, галакторея у жінок.

Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до препарату, перехресна чутливість до інших дибензоксепінів; маніакальний с-м; тяжкі порушення функції печінки; глаукома; затримка сечі; одночасне застосування з інгібіторами MAO.

Торгова назва:

	Торгова назва	Виробник/країна	Форма випуску	Дозування	Кількість в упаковці	Ціна DDD, грн.	Ціна DDD, у.о.
II.	ДОКСЕПІН	"Плів а Краків" Фармацевтичний Завод АТ, Польща	капс.	10 мг	№ 30	відсутня у реєстрі ОБЦ	