

Метилер гометрин	З обережністю застосовується при порушеннях функції	З обережністю застосовується при порушеннях функції	Протипоказаний при важких формах АГ	Спеціальних рекомендацій немає
Метилкобал амін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при стенокардії.	Спеціальних рекомендацій немає
Метилпреднізолон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при підвищенні АТ, ризику тромбозу, тромбоемболії, васкуліті.	Спеціальних рекомендацій немає
Метилурацил	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Метилфенідат	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності.	З обережністю при АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Метоклопрамід	У випадку тяжкої печінкової недостатності з асцитом внаслідок збільшення періоду напіввиведення застосовують половинну дозу	Підбір дози при недостатності відповідно до ступеня тяжкості.	Спеціальних рекомендацій немає	Не застосовувати при БА з чутливістю до сульфіту.
Метопролол	Корекція дози при недостатності.	Корекція дози не потрібна при недостатності.	З обережністю при СН.	З обережністю при ХОЗЛ.
Метопрололу сукцинат	може знадобитися зниження дози.	З обережністю, тільки після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик, застосовувати препарат за наявності порушень функцій	Призначення препарату хворим із застійною СН можливе тільки за умови компенсації клінічного стану пацієнта та можливості адекватного медичного нагляду. Лікування починають з мінімальної дози. З обережністю призначають пацієнтам з АВ блокадою I ступеня; може провокувати напади вазоспастичної стенокардії	Хворі на хр. обструктивні захворювання дихальних шляхів не повинні застосовувати бета-блокатори або, за необхідності, приймати їх у мінімальних дозах, можлива комбінація з бронходилататорами
Метопрололу тартрат	У випадку важкого порушення функції розглядається необхідність зменшення дози	Коригування дози не потрібне	Лікування стабільної ХСН III-IV ф.кл. вимагає ретельного нагляду лікаря	Лікування стабільної ХСН III-IV ф.кл. вимагає ретельного нагляду лікаря При БА може знадобитися збільшення дози β2-агоністів
Метотрексат	Протипоказаний при фіброзі, цирозі, гепатиті.	Протипоказаний при значних порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Припинити при ознаках легеневої токсичності (кашель, диспное).
Метронідазол	При тяжкій печінковій недостатності необхідні нижчі дози	Немає потреби у зниженні дози	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Метформін	Спеціальних рекомендацій немає	Не застосовувати при рівні креатиніну в крові > 135 мкмоль/л у чоловіків і 110 мкмоль/л у жінок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мефлоксин	Корекція дози	Спеціальних рекомендацій немає	При застосуванні з галофантином - подовження інтервалу QT.	Спеціальних рекомендацій немає

Міансерин	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності, гіпертрофії передміхурової залози.	З обережністю при СС патології.	Спеціальних рекомендацій немає
Мідазолам	застосовувати з обережністю	застосовувати з обережністю	Зменшення дози.	застосовувати з обережністю
Мідекаміцин	Протипоказаний при тяжких порушеннях функції	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мізопростол	Протипоказаний.	Протипоказаний.	Протипоказаний при захворюваннях ССС, високій АГ.	Протипоказаний при БА.
Міконазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мікст-алергени пилокві у вигляді драже	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мілдронат	З обережністю при хр. захворюваннях.	З обережністю при хр. захворюваннях.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мілнаципран	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при доброякісній гіперплазії передміхурової залози та обструкції сечовивідних шляхів.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Міпрінон	Спеціальних рекомендацій немає	При нирковій недостатності зменшувати швидкість введення препарату.	в г.фазі ІМ. не рекомендований, не повинен застосовуватися у пацієнтів з важкими обструктивними вадами серця як альтернатива відповідним оперативним втручанням	Спеціальних рекомендацій немає
Мірамістин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Міртазапін	Призначають, починаючи з найменшої дози та контролюючи кліренс міртазапіну, особливо у разі підвищення дози.	Слід контролювати кліренс креатиніну, може зменшуватись у пацієнтів із нирковою недостатністю. Кліренс міртазапіну може зменшуватись у пацієнтів з печінковою недостатністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мітоксантрон	З обережністю при виражених порушеннях функції.	З обережністю при виражених порушеннях функції.	З обережністю при ушкодженні міокарда, ХСН.	Контроль при плевральном у вилоті.
Мітоміцин	Контроль при порушеннях функції.	Контроль при порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Міфепристон	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при ГНН та ХНН	Протипоказаний при АГ IIБ ступеня і вище, вираженій гіпотензії.	Обережно препарат призначають при хронічних обструктивних захворюваннях легень (у тому числі бронхіальній астмі)
Моексиприл	Не застосовувати.	Протипоказаний при діалізі. Пацієнти з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну < 40 мл/хв.). Рекомендована початкова доза 3,75 мг на добу.	З обережністю при обструкції вихідних шляхів лівого шлуночку, мітральному стенозі.	Спеціальних рекомендацій немає

Моксифлоксацин	Корекція дози не потрібна.	Для пацієнтів з порушенням функції нирок (в тому числі при кліренсі креатиніну < 30 мл/хв/1,73 м ²), а також для пацієнтів, які знаходяться на безперервному гемодіалізі та довготривалому амбулаторному перитонеальному діалізі, корекція дози не потрібна.	Протипоказано пацієнтам з: вродженим або діагностованим набутим подовженням інтервалу QT; клінічно значущою брадикардією; клінічно значущою серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка; симптоматичними аритміями в анамнезі.	Спеціальних рекомендацій немає
Моксонідин	Спеціальних рекомендацій немає	Дозу препарату для пацієнтів з нирковою недостатністю слід підбирати індивідуально	Протипоказаний при синдром слабкості синусового вузла; брадикардії у спокої нижче 50 уд./хв	Спеціальних рекомендацій немає
Молсидомін	Корекція дози при недостатності в літньому віці.	Корекція дози при недостатності в літньому віці.	Протипоказаний при кардіогенному шоку, артеріальній гіпотензії, г. ІМ. З обережністю при артеріальній гіпотензії, прийомі вазодилляторів.	Спеціальних рекомендацій немає
Мометазон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З особливою обережністю при туберкульозі легень або з нелікованими грибковими, бактеріальними, системними вірусними інфекціями або герпетичним ураженням очей (вірусом Herpes simplex).
Монтелукаст	Корегування дози у пацієнтів з недостатністю легкого чи помірного ступеня не потрібно; з тяжкою печінковою недостатністю рекомендації щодо корегування дози відсутні.	Корегування дози у пацієнтів з нирковою недостатністю не потрібно.	Спеціальних рекомендацій немає	Не слід застосовувати для зняття гострих астматичних нападів.
Морська вода	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Морфін	Зменшення дози при недостатності.	Зменшення дози при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ДН.

Мосаприд	З обережністю застосовувати пацієнтам із печінковою недостатністю	З обережністю застосовувати пацієнтам із нирковою недостатністю	З обережністю застосовувати пацієнтам із захворюванням серця в анамнезі, включаючи СН, порушення провідності, шлуночкові аритмії (включаючи torsades de pointes), ішемію міокарда (потенційний ризик появи аритмії); при однокласному прийомі препаратів, які подовжують інтервал QT (прокаїнамід, хінідин, флекаїнід, соталол, трициклічні антидепресанти, які потенційно можуть підвищувати ризик появи аритмії)	Спеціальних рекомендацій немає
Муміо	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мупіроцин	Корекція дози не потрібна.	Не застосовувати при помірній та тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Надропарин кальцію	застосовувати з обережністю	застосовувати з обережністю (протипоказаний при тяжкій недостатності)	застосовувати з обережністю при тяжкій артеріальній гіпертензії	Спеціальних рекомендацій немає
Налбуфін	Зменшити дозу	Зменшити дозу	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при пригніченні дихання
Налоксон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Налтрексон	Протипоказаний при г. гепатиті, недостатності. Контроль функцій.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Нандролон	З обережністю призначати.	Призначати з обережністю. Перед початком та під час лікування - обстеження простати.	З обережністю при порушенні функції міокарда, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Напроксен	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжких порушеннях функцій.	З обережністю при СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Натализумаб	Дослідження щодо оцінки ефективності препарату при порушенні функції нирок або печінки не проводились. Механізм виведення препарату і результати фармакокінетичних досліджень дозволяють застосовувати препарат у цієї групи пацієнтів без коригування дози.	Дослідження щодо оцінки ефективності препарату при порушенні функції нирок або печінки не проводились. Механізм виведення препарату і результати фармакокінетичних досліджень дозволяють застосовувати препарат у цієї групи пацієнтів без коригування дози.	Особливих рекомендацій немає	Особливих рекомендацій немає
Натаміцин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Натрію аміносаліцилат	Під час лікування проводити лабораторний контроль функціонального стану печінки	Під час лікування проводити лабораторний контроль сечі	Протипоказаний при серцево-судинній недостатності II-III стадії	Спеціальних рекомендацій немає
Натрію гідрокарбонат	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при захворюваннях нирок – розвиток набряків.	З обережністю при супутніх захворюваннях серця – розвиток СН та набряків.	Спеціальних рекомендацій немає
Натрію оксидутират	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Натрію пікосульфат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Натрію тіосульфат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Натрію фторид	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Натрію хлорид	Протипоказаний при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки	Обережно вводять хворим із порушенням видільної функції нирок	Відносним протипоказанням є декомпенсовані вади серця	Протипоказаний при станах, пов'язаних з небезпекою розвитку набряку легень
Нафазолін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ССЗ.	З обережністю при БА.
Нафталанова олія	Протипоказаний при хр. недостатності.	Протипоказаний при ХНН.	Протипоказаний при СС недостатності II-III ступеня.	Спеціальних рекомендацій немає
Нафтифін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Небіволол	досвід застосування препарату у таких пацієнтів обмежений, тому небіволол протипоказаний.	рекомендована початкова доза становить 2,5 мг на добу, за необхідності добову дозу можна збільшити до 5 мг.	Моніторинг ЧСС, АТ, стану периферичного кровообігу.	З обережністю при обструктивних захворюваннях
Невірапін	Протипоказаний при вираженій недостатності; обережно при підвищеному рівні АСТ і АЛТ > 2,5 рази, гепатит В або С. Контроль показників функції.	Корекція дози при недостатності з діалізом.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Нелфінавір	З обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Неостігмін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при брадикардії, аритміях, артеріальній гіпотензії, ваготонії.	Спеціальних рекомендацій немає
Нетилміцин	Спеціальних рекомендацій немає	Контроль функції нирок. Необхідність зменшення доз.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Нефопам	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності. Протипоказаний при затримці сечі, пов'язаної з уретропростатичними порушеннями.	З обережністю при тахікардії.	Спеціальних рекомендацій немає
Нікетамід	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Нікотин	З обережністю при помірній вираженій недостатності.	З обережністю при вираженій недостатності.	З обережністю при інсульті, нестабільній стенокардії, аритмії, ангіопластичі або шунтуванні коронарних артерій, неконтрольованій АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Нілотиніб	З обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Група ризику включає пацієнтів із вродженим с-мом пролонгації інтервалу Q-T, пацієнтів, які приймають антиаритмічні препарати інші ЛЗ, які можуть призвести до подовження інтервалу Q-T.	Спеціальних рекомендацій немає
Німесулід	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності. З обережністю при недостатності.	Протипоказаний при тяжкій СН. З обережністю при СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Німодипін	Корекція дози при тяжкій недостатності, особливо цирозі.	Корекція дози при виражених порушеннях функції. Контроль показників функцій.	Корекція дози при тяжкій патології ССС. Контроль АТ, ЧСС, ЕКГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Ністатин	З обережністю при недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Нітразепам	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Зменшення дози.	Зменшення дози	Зменшення дози при порушеннях СС функцій.	Протипоказаний при тяжкій хр. ДН, с-мі зупинки дихання уві сні. Зменшення дози.
Нітроглицерин	З обережністю при виражених порушеннях функцій.	З обережністю при виражених порушеннях функцій.	З обережністю при г. ІМ, гіпоксемії, легеновому серці, гіпертрофічній кардіоміопатії, гіпотензії, стенокардії.	Спеціальних рекомендацій немає
Нітроксолін	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Зменшення дози при недостатності.	З обережністю призначають препарат пацієнтам із порушеннями функції нирок. Протипоказаний при тяжкій недостатності. Зменшення дози при помірній недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Нітропрусид натрію	З обережністю.	З обережністю.	Для деяких пацієнтів із СН доцільно додатково застосовувати інотропні препарати. Протипоказаний при г.застійній СН.	З обережністю.
Нітрофурал	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Нітроф уран тоїн	З обережністю при патології печінки.	Протипоказаний при нирковій недостатності (кліренс креатиніну менше 60 мл/хв).	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при патології легень.
Ніфедипін	Контроль функцій.	Контроль функцій. З обережністю при гемодіалізі.	Протипоказаний при кардіогенному шоку, г. коронарних с-мах, аортальному стенозі. З обережністю при злоякісній АГ, вираженій артеріальній гіпотензії.	Спеціальних рекомендацій немає

Ніф урател	Спеціальних рекомендацій немає	Рекомендована доза препарат у залежить від ступеня тяжкості захворювання	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ніф уроксазид	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ніцерголін	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшення дози.	Протипоказаний при нещодавно перенесеному ІМ, тяжкій брадикардії, порушенні ортостатичної регуляції, гіпотензії, стенокардії навантаження.	Спеціальних рекомендацій немає
Норепінефрин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при вираженій лівошлуночковій СН, аритмії, г. коронарній недостатності, нещодавньому ІМ. Зменшити дозу або відмінити при естрасистоплах.	Спеціальних рекомендацій немає
Норфлоксацин	Може застосовуватися у пацієнтів з нирковою недостатністю. При кліренсі креатиніну, що менше або дорівнює 30 мл/хв, рекомендована доза препарат у не повинна перевищувати 400 мг/добу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Озельтамивір	Немає необхідності коригувати дозу у хворим із порушенням функції печінки легкого і середнього ступенів тяжкості.	Хворим із кліренсом креатиніну 10-30 мл/хв при лікуванні рекомендується зменшити дозу до 75 мг 1 р/день протягом 5 діб, а при профілактиці рекомендується зменшити дозу до 75 мг через добу чи до 1 капс. 30 мг 1 р/добу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Оксазепам	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Контроль білірубінів і активності трансаміназ.	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Не перевищувати дози при порушеннях функції.	З обережністю при хворобах серця.	Протипоказаний при тяжкій ДН, с-мінічного апное.
Оксаліплатин	В ході досліджень не проводилась спеціальна корекція доз для хворих із порушенням функції печінки	протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності (кліренс креатиніну < 30 мл/хв).	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Оксаліплатин	Спеціальних рекомендацій немає	протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності (кліренс креатиніну < 30 мл/хв).	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Оксацилін	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози не потрібна при недостатності I-II ступеня.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Окселадин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Оксибупрокаїн	Призначати з обережністю.	Призначати з обережністю.	З обережністю при зниженому АТ, СН, аритмії.	Спеціальних рекомендацій немає

Оксибутинін	Застосовувати з обережністю	Застосовувати з обережністю	Застосовувати з обережністю пацієнтам із нейроциркуляторною дистонією, тахіаритміями, недостатністю мозкового кровообігу	Спеціальних рекомендацій немає
Оксиметазолін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій АГ, стенокардії. Застосування препарату можливе тільки після ретельної оцінки користь/ризик при - тяжких формах СС захворювань (ІХС, АГ).	Спеціальних рекомендацій немає
Окси тоцин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Октреотид	Контроль функції.	Контроль функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Оланзапін	З обережністю при пошкодженні печінки, лікуванні гепатотоксичними препаратами.	З обережністю при гіпертрофії простати.	З обережністю при серйозних ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Олія соєва	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	З обережністю.
Олмесартан	Не рекомендується.	Не рекомендується при тяжкій недостатності. З обережністю при хворобах нирок, стенозі ниркових артерій, азотемії, олігурії, ГНН. Контроль рівня калію і креатиніну.	З обережністю при стенозі аортального або мітрального клапанів, обструктивній гіпертрофічній кардіоміопатії.	Спеціальних рекомендацій немає
Олопатадин	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Олопатадин	Досліджень олопатадину у формі очних крапель у пацієнтів з порушеннями функції не проводилося; однак немає необхідності в корегуванні дозування у разі порушень функції печінки	Досліджень олопатадину у формі очних крапель у пацієнтів з порушеннями функції не проводилося; однак немає необхідності в корегуванні дозування у разі порушень функції нирок	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Омалізумаб	З обережністю	З обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Не рекомендується раптово припиняти застосування або інгалаційних КС після початку терапії
Омепразол	З обережністю при порушеннях функції.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Омоконазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ондансетрон	У пацієнтів з помірними і тяжкими порушеннями функції максимальна добова доза препарату не повинна перевищувати 8 мг.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Орлістат	Клінічні дослідження застосування препарату у хворих з порушеннями функції не проводились	Клінічні дослідження застосування препарату у хворих з порушеннями функції не проводились	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Орнідазол	Спеціальних рекомендацій немає	У випадку проведення гемодіалізу необхідно враховувати зменшення періоду напіввиведення та призначати додаткові дози препарату до або після гемодіалізу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Орнітин	Корекція дози при ослабленні функції.	Протипоказаний при недостатності тяжкого ступеня.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Орципреналін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тахікардії та інших видах аритмій. З обережністю призначають хворим з ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією.	Спеціальних рекомендацій немає
Отілонію бромід	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при гіпертрофії передміхурової залози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Офлоксацин	З обережністю при порушеннях функції.	З обережністю при порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Паклітаксел	Не рекомендується при тяжких порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	При появі тяжких порушень провідності необхідно призначити відповідне лікування, та проводити безперервний моніторинг функції серця	Спеціальних рекомендацій немає
Палівізумаб	Рекомендацій немає	Рекомендацій немає	Рекомендацій немає	Рекомендацій немає
Паліперидон	Корекція дози для пацієнтів з легким або помірним ступенем недостатності не потрібна; застосування препарату не вивчалось у пацієнтів з тяжким ступенем недостатності, слід з обережністю застосовувати його у таких пацієнтів	Доза паліперидону повинна бути знижена у пацієнтів з помірними та тяжкими порушеннями функції нирок	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Панавір	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій патології	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Панкреатин	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Пантокрин	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при важких формах нефриту.	Протипоказаний при АГ, органічних ураженнях серця, стенокардії, вираженому атеросклерозі.	Спеціальних рекомендацій немає
Пантопрозол	Зменшення дози при тяжкій недостатності. Контроль рівня печінкових ферментів.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Папаверин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	З обережністю при ХНН, гіперплазії передміхурової залози.	Протипоказаний при тяжких захворюваннях серця, надшлунковій тахікардії; порушення AV провідності.	Спеціальних рекомендацій немає
Парацетамол	Протипоказаний при недостатності, значних порушеннях функції.	Протипоказаний при значних порушеннях функції, обережно при вираженій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Парекоксиб	З обережністю при помірних, не рекомендується – при тяжких порушеннях функції.	З обережністю при тяжких порушеннях функції.	З обережністю при порушеннях серця. Протипоказаний при застійній СН (клас II-IV за NYHA), підтвердженій ІХС, захворюваннях периферичних артерій та/або цереброваскулярних захворюваннях.	Протипоказаний при бронхоспазмі, гострому риніті, носових поліпах.
Пароксетин	При недостатності - зменшити дозу.	При вираженій недостатності - зменшити дозу.	З обережністю при ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Пасифлора	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пегаспаргаза	Корекція дози не потрібна	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пегінтерферон альфа-2b	Протипоказаний при захворюваннях в стадії декомпенсації, тяжкій недостатності.	Зменшити дозу при недостатності середнього та важкого ст. тяжкості.	З обережністю при застійній СН, ІМ або аритмії. ЕКГ-контроль.	Рідко інфільтрати, пневмонії та пневмонії.
Пегінтерферон альфа-2a	Протипоказаний при декомпенсованому цирозі печінки	Застосовувати з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пеметрексед	Не рекомендується.	Не рекомендується при кліренсі креатиніну <45 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Дренування порожнинної рідини перед лікуванням.
Пеніциламін	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ревматоїдному запаленні суглобів з дисфункцією нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пентоксифілін	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшити дозу при недостатності.	З обережністю при гіпотензії, тяжких аритміях, вираженому склерозі коронарних судин.	Спеціальних рекомендацій немає
Перекис водню	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Периндоприл	Печінкова недостатність: не потребує підбирання дози	Необхідно підбирати дозу залежно від кліренсу креатиніну та відповіді пацієнта на лікування	Протипоказаний при стенозі артеріального, мітрального клапану з вираженими порушеннями гемодинаміки; гіпертрофічною кардіоміопатією.	Спеціальних рекомендацій немає
Перметрин	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.

Пефлоксацин	Застосовується доза 400 мг кожні 24-48 годин після визначення концентрацій пефлоксацину у сироватці. Протипоказаний при тяжкій печінковій недостатності.	Зниження дози не потребується. Немає необхідності у додатковому дозуванні після закінчення діалізу. Протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пивні дріжджі	Протипоказаний.	Протипоказаний.	Протипоказаний при ССЗ у стадії декомпенсації.	Спеціальних рекомендацій немає
Підотимод	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пізотифен	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при гіпертрофії простати. Підбір дози при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пілокарпін	Спеціальних рекомендацій немає.	З обережністю застосовувати при обструкції сечових шляхів.	З обережністю застосовувати при таких станах: г. серцева недостатність; тяжка брадикардія; артеріальна гіпотензія/гіпертензія; та пацієнтам, які нещодавно перенесли інфаркт міокарда.	З обережністю застосовувати при БА.
Пімекролімус	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пінаверіум бромід	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Піоглітазон	Протипоказаний при виражених порушеннях функції.	Корекція дози не потрібна.	З обережністю при СН III – IV ФК.	Спеціальних рекомендацій немає
Піпекуронію бромід	З обережністю при захворюваннях.	Ниркова недостатність продовжує дію і час так званого «повернення» хворого.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Піперазин уадипінат	протипоказаний при хронічній печінковій недостатності	протипоказаний при хронічній нирковій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Піразинамід	Протипоказаний при тяжкій печінковій недостатності.	Звичайна доза піразинамід для пацієнтів з помірними порушеннями функції нирок становить від 12 до 20 мг/кг маси тіла на день. Потрібно уникати застосування піразинамід у пацієнтів з кліренсом креатиніну нижче 50 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пірантел	Не рекомендується.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пірацетам	Корекція дози не потрібна.	З обережністю при недостатності, протипоказаний при термінальній ст.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Пірензепін	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	обережно при тахікардії.	спеціальних рекомендацій немає.
Пірибедил	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при кардіоваскулярному шоку, г. фазі ІМ	Спеціальних рекомендацій немає

Піридоксин	З обережністю при тяжких ураженнях. Може призвести до хибно позитивної проби на уробіліноген з використанням реактиву Ерліха.	Спеціальних рекомендацій немає	При протипоказаний. ІХС	Спеціальних рекомендацій немає
Піридистигмін	Контроль функції при перенесених захворюваннях.	Протипоказаний при механічній непрохідності сечовивідних шляхів. Зменшити дозу при захворюваннях нирок.	З особливою обережністю при брадикардії.	Протипоказаний при БА і спастичному бронхіті.
Піритинол	З обережністю при виражених порушеннях функції.	З обережністю при захворюваннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Піроксикам	З обережністю при дисфункції.	Призначати з обережністю.	З обережністю при СН.	Протипоказаний при БА.
Пластикові внутрішньоматкові протизаплідні засоби з прогестинами	Протипоказаний при гострих захворюваннях, пухлинах печінки.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при уроджених захворюваннях серця або пороках клапанів серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Платифілін	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при недостатності, гіпертрофії передміхурової залози, затримці сечі, захворюваннях з обструкцією сечовивідних шляхів.	Протипоказаний при миготливій аритмії, тахікардії, хр. недостатності кровообігу, ІХС, мітральному стенозі, АГ.	Протипоказаний при ХОЗЛ.
Повідон йод	Протипоказаний при печінковій недостатності.	Протипоказаний при нирковій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Подорожник великий	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Пододфілотоксин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Поліестрадіолу фосфат	З обережністю, контроль лабораторних показників функції.	З обережністю при недостатності.	Контроль АТ. З обережністю при СН.	З обережністю при БА.
Поліоксидоній	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю препарат потрібно застосовувати пацієнтам із гострою нирковою недостатністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Поліплатиллен	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Посаконазол	рекомендації щодо корекції дози в цій категорії хворих не визначені.	корекція дози препарату не потрібна.	з обережністю.	спеціальних рекомендацій немає.
Правастатин	З обережністю при захворюваннях, зловживанні алкоголем.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Празиквантел	Необхідно бути обережними при декомпенсованій печінковій недостатності та у відношенні до пацієнтів з шистосомозом печінки	Контролювати функцію нирок	Пацієнти у період лікування мають перебувати під наглядом.	Спеціальних рекомендацій немає.

Празозин	Не рекомендується при тяжкій недостатності.	Не рекомендується при тяжких порушеннях функції.	Протипоказаний при стенозі аорти та мітрального клапана, емболії легеневої артерії, захворюваннях перикарда; вадах серця зі зниженим тиском наповнення лівого шлуночка.	Спеціальних рекомендацій немає
Праміпексол	Корекція дози не потрібна	Зменшити дозу	Обережно при тяжкій СС патології. Контроль АТ.	Спеціальних рекомендацій немає
Прамірацетам	Протипоказаний при печінковій недостатності	Протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності, обережно при легкій ст.	Протипоказаний при крововиливу в мозок	Спеціальних рекомендацій немає
Прегабалін	Корекція дози не потрібна	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Преднізолон	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при нирковій недостатності, нефроуролітазі.	Протипоказаний при важкій АГ, нещодавно перенесеному ІМ, декомпensoваній хр. СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Преднізон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при вираженій АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Преноксдіазин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при підвищеній бронхіальній секреції.
Прифінію бромід	З обережністю	З обережністю	З обережністю	З обережністю
Прогестерон	Протипоказаний при порушеннях функції печінки, тяжкій печінковій недостатності, гепатиті.	З обережністю при нирковій недостатності.	З обережністю при СН, тромбоемболії	З обережністю при астмі.
Продукти життєдіяльності лактобактерій	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Прокаїн	З обережністю при зниженні печінкового кровотоку.	З обережністю при недостатності.	Контроль функції CCC.	Контроль функції дихальної системи.
Прокаїнамід	застосовується менша разова доза або триваліші інтервали між прийомами, що забезпечує підтримання терапевтичного рівня препарату у крові, а також зменшує вірогідність виникнення дозозалежних побічних реакцій.	застосовується менша разова доза або триваліші інтервали між прийомами, що забезпечує підтримання терапевтичного рівня препарату у крові, а також зменшує вірогідність виникнення дозозалежних побічних реакцій.	Протипоказаний при блокадах, хр. СН, гіпотензії, паркінсонізмі, кардіогенному шоку. З обережністю при ІМ. Контроль АТ та ЕКГ, застосовується менша разова доза або триваліші інтервали між прийомами, що забезпечує підтримання терапевтичного рівня препарату у крові, а також зменшує вірогідність виникнення дозозалежних побічних реакцій.	Спеціальних рекомендацій немає
Проксиметакаїн	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ССЗ.	З обережністю при захворюваннях респіраторної системи.
Прометрієн	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Пропафенон	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Корекція дози	Корекція дози.	Протипоказаний при блокадах, застійній СН, кардіогенному шоку, тяжкій брадикардії, CCCB, артеріальній гіпотензії. З обережністю при важких ураженнях міокарду.	Протипоказаний при тяжких ХОЗЛ.
Прополіс	Протипоказаний при підвищеній чутливості або індивідуальна непереносимість, особливо в осіб із захворюваннями печінки.	Протипоказаний при підвищеній чутливості або індивідуальна непереносимість, особливо в осіб із захворюваннями нирок.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Пропофол	З обережністю при недостатності	З обережністю при недостатності.	З обережністю при СН.	З обережністю при ДН.
Пропранолол	застосовують з обережністю та підбираючи початкову дозу.	слід збільшити інтервал між прийомом препарату або зменшити дозу, щоб уникнути кумуляції препарату.	З обережністю при АВ блокада І ступеня	З обережністю при хр. бронхіті, емфізем легень.
Протефлазид	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Протіонамід	Протипоказаний при г. гепатиті, цирозі. З обережністю при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Проурокиназа	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Застосування препарату при АГ, кризі - можливий рецидив внутрішньочерепного крововиливу.	Спеціальних рекомендацій немає
Рабепразол	Корекція дози не потрібна.	З обережністю при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ралтегравір	Немає необхідності у корекції дозування для пацієнтів з порушеннями функції печінки від легкого до помірного ступеня тяжкості. Не встановлені безпека та ефективність застосування препарату у пацієнтів із тяжкими захворюваннями печінки, тому препарат з обережністю призначають цій групі пацієнтів.	Немає необхідності у корекції дозування препарату.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Раміприл	З обережністю при недостатності. Максимальна доведена добова доза для дорослих становить 2,5 мг.	З обережністю при недостатності. Якщо кліренс креатиніну становить від 50 до 20 мл/хв на 1,73 м ² площі поверхні тіла, зазвичай застосовується початкова добова доза для дорослих 1,25 мг. Максимальна доведена добова доза в цьому випадку становить 5 мг.	З обережністю при застійній СН.	Спеціальних рекомендацій немає

Ранітидин	З обережністю	(кліренс креатиніну < 50 мл/хв)-добова доза препарат у цієї категорії пацієнтів – 1 таблетка (150 мг).	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Раунатин	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при нефросклерозі.	Протипоказаний при гіпотензії, СН, органічних ураженнях серця, брадикардії, аортальних пороках, вираженому церебральному атеросклерозі. З обережністю при стенокардії.	Протипоказаний при БА.
Рекомбінантний антитимофільний фактор	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Репалгінід	Протипоказаний при виражених порушеннях функції.	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Респіброн	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ретапамулін	корекція дози не потрібна	корекція дози не потрібна	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Ретиналамин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ретинол	Спеціальних рекомендацій немає.	З обережністю призначають препарат при г. та хр.нефриті.	З обережністю призначають препарат при СН в стадії декомпенсації.	Спеціальних рекомендацій немає.
Рибавірин	Протипоказаний при тяжкій недостатності, некомпенсованому цирозі.	Протипоказаний при тяжкій недостатності з проведенням гемодіалізу.	Протипоказаний при тяжких захворюваннях ССС.	Спеціальних рекомендацій немає
Рибомуніл	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Рибофлавін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ривароксабан	Протипоказаний	При нирковій недостатності тяжкого ступеня ривароксабан слід застосовувати з обережністю; не рекомендується для пацієнтів з кліренсом креатиніну менше 15 мл/хв	З обережністю при неконтрольованій артеріальній гіпертензії тяжкого ст., нещодавно перенесений внутрішньочерепний або внутрішньомозковий кроволив; судинна патологія головного або спинного мозку	Спеціальних рекомендацій немає
Рилузол	Протипоказаний при недостатності. З обережністю при гепатиті, підвищеному рівні трансаміназ, білірубіну.	Протипоказаний при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Римантадин	Протипоказаний при хр. захворюваннях, при порушеннях функції рекомендовано зниження дози препарат у.	Протипоказаний при захворюваннях	З обережністю при важких ССЗ, порушеннях серцевого ритму, рекомендовано зниження дози препарат у.	Спеціальних рекомендацій немає

Рисперидон	Початкова та подальша доза мають бути розділені навпіл, а також потрібно дотримуватись сповільненого титрування дози.	Початкова та подальша доза мають бути розділені навпіл, а також потрібно дотримуватись сповільненого титрування дози.	З обережністю при СН, ІМ, порушеннях провідності серцевого м'яза, АВ блокаді.	Спеціальних рекомендацій немає
Ритонавір	з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ритуксимаб	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний з тяжкою серцевою недостатністю	Застосовувати з обережністю
Рифабутин	З обережністю при тяжкій недостатності. Зменшення дози у разі тяжкої печінкової недостатності.	Зменшити дозу при тяжкій недостатності. Тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну нижче 30 мл/хв.) потребують зниження дози на 50%.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Рифампіцин	Протипоказаний при тяжких порушеннях функцій печінки. Добова доза не повинна перевищувати 8 мг/кг для пацієнтів з порушеннями функції печінки.	Протипоказаний при тяжких порушеннях функцій нирок.	Протипоказаний при тяжкій легенево-серцевій недостатності	
Рифапентин	Протипоказаний при печінковій ниркової недостатності.	Протипоказаний при нирковій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Рифацин	Протипоказаний при тяжкій недостатності, гепатиті.	Зменшити дозу при кліренс креатиніну менше 30 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Рицинова олія	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при гломерулонефриті, нефрозо нефриті.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Розиглітазон	Протипоказаний при середній і важкій недостатності.	Протипоказаний при важкій недостатності.	Протипоказаний при важкій СН III і IV ФК	Спеціальних рекомендацій немає
Розувастатин	Протипоказаний.	Протипоказаний при тяжкій недостатності, з обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Розчин альбуміну людини	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Застосовують з обережністю внаслідок можливого виникнення гострої СН.	Спеціальних рекомендацій немає.
Рокситроміцин	Зменшити дозу при тяжкій недостатності.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Рокуронію бромід	З обережністю при захворюваннях печінки та/або жовчовивідних шляхів.	З обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ропівакаїн	Клінічні та фармакокінетичні дослідження на пацієнтах з тяжким захворюванням печінки не проводилися.	Немає потреби у зміні дози для пацієнтів з порушенням функції нирок	Пацієнти, яких лікують антиаритмічними ЛЗ III класу (аміодароном), мають перебувати під ретельним наглядом	Спеціальних рекомендацій немає

Ропінірол	печінкова недостатність - протипоказаний	тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв.) - протипоказаний. У хворих з легкою та помірною нирковою недостатністю (кліренс креатиніну становить 30–50 мл/хв.) - коригування дози не потрібне.	Ч/з ризик виникнення артеріальної гіпотензії рекомендується контролювати АТ, особливо на початку терапії (ризик постуральної гіпотензії) для пацієнтів з тяжкими порушеннями ССС (особливо при СН)	спеціальних рекомендацій немає
Рофеексиб	З обережністю при цирозі.	З обережністю при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при перенесеному ІМ, інсульті, прогресуючому клінічному атеросклерозі.	Не рекомендується при БА.
Рофлуміласт	Пацієнти, які мають ступінь А за шкалою Чайлд-П'ю, не потребують коригування дозування; пацієнтам зі ступенем В і С за шкалою Чайлд-П'ю не слід застосовувати препарат	Коригування дозування не потрібне	Дослідження у пацієнтів із застійною СН не проводились (NYHA 2-3 класу), тому лікування пацієнтів даної групи препаратом не рекомендовано	Не призначається для полегшення бронхоспазму гострого характеру
Сальбутамол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю через виникнення випадків ішемії міокарда	З обережністю при тяжкій БА.
Сальметерол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Необхідно з обережністю застосовувати для лікування хворих з існуючими серцево-судинними захворюваннями - можуть виникати кардіосудинні ефекти, такі як підвищення систолічного тиску та збільшення частоти серцевих скорочень, подовження інтервалу QT та посилене серцевбиття.	З обережністю при БА
Сахароміцетибуларді	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Севеламер	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при недостатності. Моніторинг рівня бікарбонатів.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Севолуран	не погіршує існуючу печінкову недостатність.	призначати з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Секвіфенадин	Дотримуватись обережності при порушенні функції	Дотримуватись обережності при порушенні функції нирок (лікування починають з мінімальної дози)	Дотримуватись обережності при тяжких захворюваннях СС системи	Спеціальних рекомендацій немає
Секнідазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Селегілін	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при недостатності.	З обережністю при лабільній АГ, серцевій аритмії, тяжкій стенокардії.	Спеціальних рекомендацій немає
Сениглікозиди	З обережністю при захворюваннях	З обережністю при захворюваннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Сертакон азол	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Сертиндол	Протипоказаний при недостатності тяжкого ступеня. Зменшити дозу при легки/середніх ст..	Корекція дози не потрібна.	Протипоказаний при застійній СН, кардіогіпертрофії, аритмії, брадикардії, подовженні інтервалу QT.	Спеціальних рекомендацій немає
Сертралін	Зменшити дозу	Корекція дози не потрібна	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Сибутрамін	З особливою обережністю.	Призначати обережністю.	Контроль АТ та ЧСС. З обережністю при призначенні з препаратами, які збільшують інтервал QT, зменшенні концентрації калію та магнію крові.	Спеціальних рекомендацій немає
Сигетин	Призначати з обережністю.	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Силімарин	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Сильденафіл	Зменшити дозу при недостатності, цирозі.	Зменшити дозу при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при нестабільній стенокардії, тяжкій СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Симвастатин	Протипоказаний при гострих захворюваннях, стійкому підвищенні рівнів трансаміназ. Контроль функції	З обережністю при тяжкій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Симетикон	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Сироватка проти дитерійна кінська очищена концентрована рідка	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Слива африканська	Спеціальних рекомендацій немає	Контроль за станом передміхурової залози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Солізім	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Соліфенацин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при затримці сечовипускання, гемодіалізі, тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Солкосерил	спеціальних рекомендацій немає.	з обережністю.	з обережністю.	спеціальних рекомендацій немає.
Сорафеніб	Корекції дози препарат у не потрібна	Корекції дози препарату не потрібна	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Соталол	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при недостатності.	Протипоказаний при хр. СНі, гострому ІМ, шоку, артеріальній гіпотензії, блокадах, СССВ, брадикардії, подовженні інтервалу QT. З обережністю при стенокардії Принцметала, порушеннях скоротливості міокарда	Протипоказаний при обструктивних захворюваннях

Спарфлоксацин	Для пацієнтів зі слабо вираженими або помірними порушеннями функції печінки без холестазу корекція дози не потрібна.	Протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Спектиноміцин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Спіраміцин	Спеціальних рекомендацій немає.	Немає необхідності коригувати дозування.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Спіраприл	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності. У хворих із кліренсом креатініну менше 10 мл/хв, лікування препаратом не проводять.	З обережністю при застійній СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Спіронолактон	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ГНН, тяжких формах ХНН.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ставудин	З обережністю при гепатиті, недостатності.	Перед початком лікування – контроль функціонального стану.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Стрептокіназа	З обережністю при тяжких ушкодженнях.	З обережністю при хворобах серцево-судинного тракту, тяжких ушкодженнях нирок.	З обережністю при цереброваскулярних захворюваннях, дефектах мітрального клапана, фібриляції передсердь, ендотерікардиті.	З обережністю при кавернозному туберкульозі, тяжкому бронхіті.
Стрептоміцин	Зменшити дозу.	Протипоказаний при тяжких формах ниркової недостатності.	Протипоказаний при тяжких формах серцево-судинної недостатності.	Спеціальних застережень немає.
Стронцію ранелат	Спеціальних рекомендацій немає	Не рекомендується при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Строфантин	Спеціальних рекомендацій немає	З особливою обережністю.	З особливою обережністю при передсердній екстрасистолії.	Спеціальних рекомендацій немає
Сукральфат	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ХНН, гемодіалізі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Суксаметоній	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Сульпірид	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшити дозу при порушеннях функції.	Перш ніж вводити препарат, і якщо дозволяє клінічна ситуація, слід перевірити наявність у пацієнтів факторів ризику, які можуть сприяти розвитку аритмії.	Спеціальних рекомендацій немає
Сульфадиметоксин	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при декомпенсованій хр. СН	З обережністю у пацієнтів з БА.
Сульфадимідин	Протипоказаний при виражених порушеннях функції печінки.	Протипоказаний при виражених порушеннях функції нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Сульфадіазин срібла	застосовувати з обережністю	застосовувати з обережністю	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Сульфаніламід	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при нефрозах, нефритах.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Сульфасалазин	Призначати з обережністю.	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при БА.

Сульфатіазол	з обережністю	з обережністю	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Сульфацетамід	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Сульфокамфоквіт	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Суматриптан	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ІМ, ІХС, стенокардії Принцметала, захворюваннях периферичних судин. З обережністю при АГ.	спеціальних рекомендацій немає
Сунітиніб	з легким та помірним ступенями порушення функції печінки корекція дози не потрібна	У пацієнтів з рівнем креатиніну що не перевищує (у 2 рази вище за норму) зазначені межі корекція дози не потрібна	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Тадалафіл	З обережністю при тяжкій недостатності та тяжкими порушеннями функції.	Щоденне застосування препарату не рекомендується у пацієнтів із серйозними нирковими порушеннями.	З особливою обережністю при ІМ, нестабільній стенокардії, СН, неконтрольованій аритмії, артеріальній гіпотензії, неконтрольованій АГ.	спеціальних рекомендацій немає
Такролімус	Зменшити дозу при тяжкій недостатності.	Контроль функції (концентрація креатиніну в сироватці крові, кліренс креатиніну та рівень діурезу).	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Талідомід	особливості дозового режиму у пацієнтів з печінковою недостатністю невідомі	особливості дозового режиму у пацієнтів з нирковою недостатністю невідомі	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Тамоксифен	Протипоказаний при тяжкій недостатності	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Тамсулозин	Протипоказаний при недостатності.	З обережністю при зниженні кліренсу креатиніну < 10 мл/хв. Регулярно: обстеження простати, специфічний простатичний антиген (ПСА).	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Таурин	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Тегасерод	протипоказаний пацієнтам з помірною або тяжкою печінковою недостатністю, з клінічно вираженими захворюваннями жовчного міхура, при підозрі на порушення функції сфінктера Одді	протипоказаний пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Тегасур	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Тейкопланін	спеціальних рекомендацій немає	Необхідно коригувати дозу для хворих з нирковою недостатністю	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає

Телбівудин	Призначають без коригування рекомендованої дози, ретельно контролювати функцію	Для пацієнтів з кліренсом креатиніну ≥ 50 мл/хв коригування рекомендованої дози не потрібне; якщо кліренс креатиніну < 50 мл/хв, включаючи ниркову недостатність термінальної стадії з гемодіалізом, інтервал між дозами коригують	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Телмісартан	У пацієнтів із біліарними обструктивними порушеннями або печінковою недостатністю препарат приймати з обережністю; використовувати з обережністю пацієнтам із слабкими до помірних порушеннями функції	Пацієнти з нирковою недостатністю, включаючи тих, що підлягають діалізу, не потребують корекції дози.	Спеціальних рекомендацій немає	З особливою обережністю призначають пацієнтам, які страждають на стеноз аорти, мітрального клапану або обструктивну гіпертрофічну кардіоміопатію
Темозоломід	Зменшити дозу при виражених порушеннях	Зменшити дозу при виражених порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тенектеплаза	Протипоказаний при недостатності, цирозі, гіпертензії ворітної вени, гепатиті.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при значних порушеннях кровообігу, перикардит, підгострому бактеріальному ендокардиті.	Спеціальних рекомендацій немає
Тенофовірудизопроксил	Не схвалений для лікування хронічних інфекцій вірусу гепатиту В (HBV).	Корекція інтервалу між дозами та ретельне спостереження за функцією нирок рекомендується для всіх пацієнтів із кліренсом креатиніну < 50 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Теофілін	З обережністю при захворюваннях печінки. Зменшити дозу.	З обережністю при гіпертрофії передміхурової залози.	Протипоказаний при тяжкій АГ, ІМ, тахіаритмії, гіпертрофічній обструктивній кардіоміопатії.	Зменшити дозу при пневмонії.
Теразозин	З обережністю при печінковій недостатності.	З обережністю при нирковій недостатності.	З обережністю слід призначати теразозин пацієнтам зі схильністю до розвитку ортостатичної гіпотензії, при ішемічній хворобі серця та при інших тяжких захворюваннях серця. Лікування теразозином приводить до зменшення гіпертрофії лівого шлуночка	Його застосування безпечно для хворих на БА
Тербінафін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Теризидон	Протипоказаний	Контроль функції нирок	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Теризидон	Протипоказаний	Контроль функції нирок		

Терліпресин	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю застосовувати при нирковій недостатності.	обережно застосовувати хворим з ІХС, тяжкою АГ, ураженням серця і судин (поширений атеросклероз, захворювання серця, коронарна недостатність, аритмія),	обережно застосовувати при БА
Тестостерон	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій СН. У зв'язку з можливою схильністю до тромбоемболії слід призначати препарат чоловікам після нещодавно перенесеної операції або травми.	Спеціальних рекомендацій немає
Тетрациклін	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при захворюваннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тетризолін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ІХС, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Тетризолін	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає	У пацієнтів з тяжкими формами СС захворювань (ІХС, гіпертензія, феохромоцитома), краплі можна застосовувати тільки після зіставлення можливої користі та ризику для хворого	спеціальних рекомендацій немає
Тиболон	Протипоказаний.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при СС розладах	З обережністю при астмі.
Тизанідин	Протипоказаний при виражених порушеннях функції. Контроль печінових проб.	Зменшити дозу при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тиклопідин	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тиклопідин	з обережністю застосовувати для лікування пацієнтів з недостатністю печінки	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тилорон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тимолол	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Протипоказаний при синусовій брадикардії, АВ блокада (II III ст.), СН, кардіогенному шоку, СН.	Протипоказаний при БА, схильності до розвитку бронхоспазму або ХОЗЛ.
Тинідазол	Спеціальних рекомендацій немає	Корекція дози при гемодіалізі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тиротропін альфа	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Тіамазол	Пацієнтам з печінковою недостатністю препарат слід застосовувати в максимально низьких ефективних дозах.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Пацієнтам з звуженням трахеї та зобом дуже великих розмірів слід протягом короткого періоду застосовувати, довготривала дія може призвести до росту зоба.
Тіамін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тіанетин	Спеціальних рекомендацій немає	Доза становить 2 таблетки на добу в два прийоми перед їдою	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тіогуанін	Зменшити дозу.	Зменшити дозу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тіопентал натрію	Протипоказаний.	Протипоказаний при дисфункції. Зменшити дозу.	Протипоказаний при г. порушенні кровообігу. З обережністю при порушенні скоротувальної функції міокарда.	Протипоказаний при БА, астматичному статусі, запальних захворюваннях носоглотки.
Тіоридазин	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності.	Протипоказаний при тяжкій СС-с-мі недостатності, подовженого інтервалу QT, шлуночкових порушеннях серцевого ритму, вираженій брадикардії, СА або AV блокаді провідності III ступеня; тяжкій артеріальній гіпотензії.	З обережністю при хр. захворюваннях з порушенням дихання.
Тіотриазолін	Застосовувати препарат згідно з рекомендованою дозою	З обережністю при недостатності.	Застосовувати препарат згідно з рекомендованою дозою	Спеціальних рекомендацій немає
Тіотропію бромід	Корекція дози не потрібна при печінковій недостатності.	Під медичним контролем у пацієнтів із нирковою недостатністю, від помірної до тяжкої (кліренс креатиніну < 50 мл/хв.). З обережністю при гіперплазії передміхурової залози, обструкції шийки сечового міхура.	Спеціальних рекомендацій немає	Застосування інгаляційних ЛЗ може спричинити бронхоспазм, спричинений проведенням
Тобраміцин	Не досліджувався для цієї категорії пацієнтів. Однак через низьку системну абсорбцію тобраміцину після місцевого застосування препарату немає необхідності у корегуванні доз.	Не досліджувався для цієї категорії пацієнтів. Однак через низьку системну абсорбцію тобраміцину після місцевого застосування препарату немає необхідності у корегуванні доз.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Токоферол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при атеросклерозі, підвищеному ризик розвитку тромбоемболії.	Спеціальних рекомендацій немає
Толперизон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Толтеродин	Бути обережними при застосуванні	Бути обережними при застосуванні	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Топірамат	З обережністю при ушкодженнях	З обережністю при вадах функції, нефролітіазі, захворюваннях	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при тяжких респіраторних захворюваннях
Топотекан	Змінювати дозу пацієнтам з порушенням функції печінки не потрібно, якщо рівень білірубіну знаходиться у межах 1,5 - 10 мг/дл	Рекомендованою дозою для пацієнтів з кліренсом креатиніну 20–39 мл/хв є 0,75 мг/м ² /добу; з кліренсом креатиніну ³ 40 мг/мл дозу змінювати не потрібно; стосовно рекомендацій щодо дозування для пацієнтів з кліренсом креатиніну < 20 мг/хв даних недостатньо	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Торасемід	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Тореміфен	слід призначати з обережністю	Корекція дози не потрібна при недостатності.	З обережністю при декомпенсованій СН, тяжкій стенокардії.	Спеціальних рекомендацій немає
Тофізіопам	Призначати з обережністю.	Призначати з обережністю.	З обережністю при артеріосклерозі.	Протипоказаний при некомпенсованій ДН, респіраторному у дистресі.
Травопрост	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Трамадол	Зменшити дозу при недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Трамазолін	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при гіпертрофії простати.	З обережністю при АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Трандолаприл	Ретельний моніторинг пацієнтів з порушенням функції; розпочинати лікування пацієнтів з тяжкою недостатністю рекомендовано з дози 0,5 мг	Пацієнтам з недостатністю з кліренсом креатиніну ≤ 10 мл/хв застосовувати не рекомендується	Не слід застосовувати при аортальному стенозі або обструктивних порушеннях кровооток у пацієнтів із СН з обережністю у	Спеціальних рекомендацій немає
Трастузумаб	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	При СН, АГ, ІХС виявляти особливу обережність	Спеціальних рекомендацій немає
Третиноїн	При недостатності, дозу препарат у необхідно зменшити до 25 мг/м ² .	При недостатності, дозу препарат у необхідно зменшити до 25 мг/м ² .	З обережністю при ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Тригексифенідил	З обережністю	Протипоказаний при затримці сечовипускання, аденомі передміхурової залози. З обережністю при гіпертрофії простати без наявності залишкової сечі.	Протипоказаний при фібриляції передсердь. З обережністю при захворюваннях серця, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Тримеперидин	Призначати з обережністю.	З обережністю при гіпертрофії простати.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при порушенні дихання.
Триметазидин	спеціальних рекомендацій немає.	рекомендується особливий догляд з можливим зменшенням дози.	застосовується для базисної терапії стенокардії, але не для купірування нападів стенокардії.	спеціальних рекомендацій немає.
Трипторелін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Трифлуоперазин	Протипоказаний при г. та хр. запальних захворюваннях.	Протипоказаний при тяжкій недостатності. З обережністю при доброякісній гіперплазії передміхурової залози.	Протипоказаний при хворобах серця з порушенням провідності в ст. декомпенсації.	При захворюваннях хр. призначають тільки після порівняння ризику і користі лікування
Трімцінолон	Зменшити дозу при цирозі.	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Тропікамід	Спеціальних рекомендацій немає	Призначати з обережністю хворим на простатит	З обережністю при АГ, порушеннями CCC.	Спеціальних рекомендацій немає
Тропісетрон	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Умifenovir	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Урапідил	з особливою обережністю застосовувати при порушенні функцій	з особливою обережністю застосовувати пацієнтам з помірним або важким ступенем порушення функцій	з особливою обережністю застосовувати при СН, спричиненій механічною дисфункцією (стеноз аорти або мітральний стеноз, емболія легеневої артерії, погіршення серцевої функції, спричиненої перикардialними захворюваннями)	спеціальних рекомендацій немає
УРО-БЦЖ	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при невеликому об'ємі сечового міхура.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Урокіназа	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності. З обережністю при уролітазі, пієлонефриті, пухлинах сечостатевої системи.	Протипоказаний при тяжкій АГ, ендокардиті, вадах у стадії декомпенсації мітрального клапана з фібриляцією передсердь, ретинопатії, пов'язаній з АГ.	Протипоказаний при відкритій формі туберкульозу, необоротному бронхоектазі зі змішаною домішкою кровохаркання.
Урофолітропін	Особливих рекомендацій немає	Особливих рекомендацій немає	З обережністю у жінок з підвищеним ризиком розвитку тромбоемболічних станів.	Особливих рекомендацій немає
Устекінумаб	Дозових рекомендацій зробити не можна	Дослідження проводились не	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фактор IX коагуляції крові людини	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Фактор VIII коагуляції крові, октолог альфа	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Фактор згортання крові VII	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фактор коагуляції крові людини VIII	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Фамотидин	Зменшити дозу при недостатності.	З обережністю при недостатності, якщо кліренс креатиніну < 3 мг/100 мл, слід зменшити щоденну дозу до 20 мг або збільшити інтервал між прийомом доз до 36-48 год ин.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фамцикловір	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Фексофенадин	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фелодипін	можливо суттєве посилення антигіпертензивного ефекту, що потребує корекції режиму дозування та постійного клінічного нагляду.	при тяжких порушеннях функції нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) застосування препарату можливо лише за умови оцінки співвідношення користь/ризик і вимагає особливої обережності та постійного клінічного контролю.	При схильності до артеріальної гіпотензії, при вираженій серцевій недостатності, гемодинамічно значущому аортальному та мітральному стенозах, обструктивній формі гіпертрофічної кардіоміопатії застосування препарату можливо лише за умови оцінки співвідношення користь/ризик і вимагає особливої обережності та постійного клінічного контролю.	Спеціальних рекомендацій немає
Феназепам	Протипоказаний при значних порушеннях функції.	Протипоказаний при значних порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фенілефрин	Протипоказаний при порфірії.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Фенілефрин	Печінкова порфірія, уроджений дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази - протипоказаний.	Спеціальних рекомендацій немає.	Тяжкі порушення з боку серцево-судинної або церебрально-васкулярної системи - протипоказано. З обережністю призначати пацієнтам із захворюванням ССС, аритмією, хворим на АГ.	Спеціальних рекомендацій немає.
Феніндіон	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	З обережністю при підвищеній проникності судин, перикардиті.	Спеціальних рекомендацій немає
Фенітоїн	Протипоказаний при недостатності, з обережністю при хр. захворюваннях.	Протипоказаний при недостатності, з обережністю при хр. захворюваннях.	Протипоказаний при с-мі Адамса-Стокса, АВ-блокаді II-III ст., СА блокаді, синусовій брадикардії, СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Фенобарбітал	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Зменшити дозу при недостатності, збільшити дозу після гемодіалізу та перитонеального діалізу.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при захворюваннях органів дихання з обструкцією та диспное.
Фенол	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фенотерол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при гіпертрофічній обструктивній кардіоміопатії, тахіаритмії. З обережністю при нещодавно перенесеному ІМ, органічних ураженнях серця, судин.	З обережністю при БА.
Фенотропил	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій АГ, атеросклерозі.	Спеціальних рекомендацій немає

Фенофібрат	Протипоказаний при недостатності, цирозі, захворюваннях жовчного міхура.	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Контроль креатиніну.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фенспірид	В інструкції рекомендацій немає.	В інструкції рекомендацій немає.	В інструкції рекомендацій немає.	В інструкції рекомендацій немає.
Фентаніл	Протипоказаний при тяжкій недостатності, при порушенні функції з обережністю.	З обережністю при порушеннях функції, гіпертрофії простати.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при порушеннях дихання, БА.
Фентиконазол	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Фібринолізин	застережень немає	застережень немає	застережень немає	застережень немає
Філграстим	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фінастерид	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при великому залишковому об'ємі сечі або різко зниженомуплині сечі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Флувастатин	Протипоказаний при активних захворюваннях, персистуючому підвищенні трансаміназ.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Флувоксамін	Призначати з обережністю.	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Флударабін	Призначати з обережністю.	Зменшити дозу при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Флудрокортизон	У хворих з недостатністю щитоподібної залози або цирозом печінки дія флудрокортизону сильніша.	Застосовувати обережно	Застосовувати з обережністю	
Флуконазол	Контроль під час лікування.	Корекція дози.	З обережністю при потенційно проаритмічних станах	Спеціальних рекомендацій немає
Флуоксетин	Призначати з обережністю.	Протипоказаний при виражених порушеннях функції, доброякісній гіперплазії передміхурової залози, атонії сечового міхура. З обережністю при порушеннях функції.	З обережністю при ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Флуоцинолон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	застосування засобу під оклюзійну пов'язку, враховуючи підвищене всмоктування, може спричинити виражену загальносистемну дію, яка проявляється у вигляді набряків, артеріальної гіпертензії	Спеціальних рекомендацій немає
Флурбіпрофен	Призначати з обережністю.	Призначати з обережністю.	З обережністю при АГ, СН	Протипоказаний при БА, риніті на фоні прийому ацетилсаліцилової кислоти, інших НПЗ.
Флуренізид	Протипоказаний при токсичному гепатиті.	Протипоказаний при тяжкій недостатності, діалізі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Флутамід	Протипоказаний при підвищенні трансаміназ в 2-3 рази. З обережністю при дисфункції.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Флуфеназин	Протипоказаний при порушеннях функції. З обережністю при захворюваннях.	Протипоказаний при порушеннях функції.	Протипоказаний при декомпенсованій хр. недостатності кровообігу, гіпотензії. З обережністю при порушеннях ритму серця.	
Флуцитозин	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшити дозу. Контролювати функцію нирок не рідше 1 разу на тиждень. Збільшити інтервал між введеннями разових доз препарату (як для дорослих і дітей).	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Флюпентиксол	З обережністю призначати пацієнтам із гепатитом	З обережністю призначати пацієнтам із нирковою недостатністю	З обережністю призначати пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями	Спеціальних рекомендацій немає
Флютиказон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З особливою обережністю Фліксотид Евохалер слід призначати хворим на активний туберкульоз легенів.
Флютиказон у фуроат	Корекція дози не потрібна при легкому та помірному ступенях печінкової недостатності; даних щодо печінкової недостатності тяжкого ступеня немає.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Фозиноприл	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності.	З обережністю при СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Фолітропін альфа	У пацієнтів з печінковою недостатністю та безпечність та ефективність препарату не були встановлені.	У пацієнтів з нирковою недостатністю безпечність та ефективність препарату не були встановлені.	У жінок зі встановленими факторами ризику розвитку тромбоемболічних явищ (індивідуальні або сімейні випадки), а також у жінок з існуючими або нещодавніми тромбоемболічними захворюваннями, лікування гонадотропінами може призвести до подальшого підвищення такого ризику - необхідно оцінити перевагу застосування гонадотропінів над ризиком розвитку подібних явищ.	Особливих застережень немає

Фолітропін бета	Особливих застережень немає	Особливих застережень немає	У жінок із загальними факторами ризик у розвитку тромбозу, такими як особистий або сімейний анамнез, ожиріння високого ступеня (індекс маси тіла > 30 кг/м ²), тромбофілія, може бути підвищений ризик розвитку венозної або артеріальної тромбоемболії при лікуванні гонадотропінами, навіть без розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників.	Особливих застережень немає
Фондапаринукс	З обережністю при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	при нестабільній стенокардії, ІМ застосовувати з обережністю при застосуванні з препаратами, що підвищують ризик кровотечі.	Спеціальних рекомендацій немає
Формотерол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ІХС, порушенні серцевого ритму і провідності, тяжкій СН, ідіопатичному підкляпанню у аортальному стенозі, гіпертрофічній обструктивній кардіоміопатії, подовженні інтервалу QT.	З обережністю при БА та тяжкого перебігу. У випадку нападу астми слід застосувати β ₂ -адреностимулятор швидкої дії
Фосфокреатин	Спеціальних рекомендацій немає	у високих дозах (5-10 г/добу) протипоказаний при ХНН	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фосфоліпіді сурфактанту	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Корекція дози при вроджених вадах розвитку.
Фосфоміцин	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фотемустин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фталісульфатіазол	спеціальних рекомендацій немає.	з обережністю.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Фтівазид	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при стенокардії, декомпенсованих вадах клапанів серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Фторурацил	З обережністю при порушеннях функції, жовтяниці.	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фузафунгін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фулвестрант	Протипоказаний при тяжкій недостатності, з обережністю при легкій/помірній недостатності.	З обережністю при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Фуразидин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв); гемодіалізі або перитонеальному діалізі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фуразолідон	Протипоказаний.	Протипоказаний при термінальній ХНН.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фуросемід	Протипоказаний при тяжких порушеннях	Протипоказаний при тяжких порушеннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фуросемід	Протипоказаний при тяжких порушеннях	Протипоказаний при тяжких порушеннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Фуросемід	Протипоказаний при тяжких порушеннях	Протипоказаний при тяжких порушеннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Хімотрипсин	Протипоказаний при дистрофії, цирозі, інфекційному гепатиті.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при декомпенсації серцеві діяльності.	Протипоказаний при емфіземі легень з ДН. З обережністю при активном у туберкульозі.
Хінаголід	При порушенні функції - протипоказаний	Порушення функції нирок - протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Хіфенадин	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжких ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Хлорамбуцил	Зменшити дозу при тяжких порушеннях функції.	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Хлорамфенікол	Корекція дозування відповідно до функціонального стану печінки	Корекція дозування відповідно до функціонального стану нирок	Спеціально не вказано	Спеціально не вказано
Хлоргексидин	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Хлордіазепоксид	Зменшити дозу.	Зменшити дозу.	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшити дозу при ДН
Хлоропірамін	З обережністю при серйозних захворюваннях.	Не рекомендується при гіперплазії передміхурової залози, затримці сечовипускання	Не рекомендується при г. ІМ, аритмії.	Не рекомендується при г. нападі астми.
Хлорофіліпт	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Хлорохін	З обережністю при захворюваннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Хлорпромазин	З обережністю при порушеннях функції. Протипоказаний при тяжких порушеннях функції (цироз, гепатит, гемолітична жовтяниця).	З обережністю при порушеннях функції, гіперплазії передміхурової залози з клінічними проявами. Протипоказаний при тяжких порушеннях функції (нефрит, гострий пієліт, амфідодоз нирок, сечокам'яна хвороба)	Протипоказаний при тяжких серцево-судинних захворюваннях (декомпенсовані серцева недостатність і вади серця, виражена міокардіодистрофія, тяжка артеріальна гіпотензія, ревмокардит на пізніх стадіях)	З обережністю при хр. захворюваннях органів дихання.
Хлорпротиксен	З обережністю при прогресуючих захворюваннях.	З обережністю при прогресуючих захворюваннях, гіпертрофії простати.	З обережністю у пацієнтів з факторами ризику інсульту, із серцевими хворобами в анамнезі або спадковим синдромом пролонгації QT ч/з ризик зловкісних аритмій.	Спеціальних рекомендацій немає

Хлорхінальдол	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Холекальциферол	Спеціальних рекомендацій немає	Не рекомендується при нефролітазі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Холін уальфосцерат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Холін усаліцилат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при БА, спричинений ацетилсаліциловою кислотою.
Хондрітин сульфат	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при недостатності у стадії декомпенсації.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Хоріонічний гонадотропін	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при порушенні функції	З обережністю при СН, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Целекоксиб	Не рекомендується при тяжкій недостатності. З обережністю при помірній недостатності. Контроль показників функції.	З обережністю при дегідратації. Контроль показників функції.	З обережністю при СНі, АГ.	Протипоказаний при БА.
Цереброкурин	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Церебrolізін	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цетиризін	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшити дозу при помірних, тяжких порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цетрорелікс	Протипоказаний при помірному, тяжкому ураженні функції.	Протипоказаний при помірному, тяжкому ураженні функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цетуксимаб	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефадроксил	Спеціальних рекомендацій немає	Корекція дози при ХНН, гемодіалізі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефазолін	З обережністю при порушеннях функції.	добову дозу знизити для уникнення токсичної дії.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефалексин	З обережністю при порушеннях функції.	Корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефепім	Спеціальних рекомендацій немає	Корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефіксим	Спеціальних рекомендацій немає	При порушенні функції нирок дозу встановлюють залежно від показника кліренсу креатиніну (КК) у сироватці крові. Добова доза не повинна перевищувати 200 мг на добу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефоперазон	Корекція дози.	Корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефотаксим	Спеціальних рекомендацій немає	При порушеннях функції нирок дозу препарату потрібно зменшити. При кліренсі креатиніну 10 мл/хв і менше добову дозу препарату зменшують удвічі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефпіром	З обережністю при порушеннях функцій.	Не рекомендується при тяжкій недостатності. З обережністю при порушеннях функцій.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Цефподоксим	Спеціальних рекомендацій немає	У пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну < 40 мл/хв) інтервал між прийомами чергової дози слід збільшити до 24 годин. У пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, препарат призначають тричі на тиждень після сеансу гемодіалізу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефтазидим	Спеціальних рекомендацій немає	Доза повинна бути зменшена. Початкова доза повинна становити 1 г. Визначення підтримуючої дози повинно базуватися на швидкості гломерулярної фільтрації.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефтибуген	Спеціальних рекомендацій немає	Корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефтобіпрол	При печінковій недостатності проводити корекцію дози не потрібно.	Для пацієнтів з помірною та тяжкою формою ниркової недостатності рекомендується коригувати дозу препарату	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефтриаксон	У хворих із порушеннями функції печінки немає необхідності знижувати дозу в тому випадку, якщо функція нирок залишається нормальною	У хворих із порушеннями функції нирок немає необхідності знижувати дозу в тому випадку, якщо функція печінки залишається нормальною	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цефуроксим	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних застережень для цієї групи хворих немає. Застосовуються звичайні дози з максимумом до 1 г на добу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Циклопентолат	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при гіперплазії передміхурової залози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Циклосерин	Контроль функції печінки.	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Контроль функції.	Протипоказаний при серцевій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає
Циклоспорин	Спеціальних рекомендацій немає	Для хворих з порушеною вихідною функцією нирок початкова доза не повинна перевищувати 2,5 мг/кг на добу. Необхідно забезпечити пильний контроль стану хворих.	Протипоказаний при неконтрольованій АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Циклоферон	Не рекомендується при декомпенсованому цирозі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Циклофосфамід	Зменшити дозу	Зменшити дозу	Регулярний контроль електролітів.	Спеціальних рекомендацій немає
Цинаризин	З обережністю застосовувати пацієнтам із недостатністю	З обережністю застосовувати пацієнтам із недостатністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цинку оксид	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.

Ципрогептадин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю застосовуватися при СС захворювання; АГ	З обережністю застосовуватися при БА в анамнезі
Ципротерон	Протипоказаний при захворюваннях, пухлинах.	З обережністю при неоперабельному раку передміхурової залози.	З обережністю при артеріальних, венозних, тромботичних явищах, цереброваскулярних хворобах	Спеціальних рекомендацій немає
Ципрофлоксацин	Корекція дози не потрібна. Застосування препарату у формі крапель для цієї категорії пацієнтів не вивчалось.	З обережністю при порушеннях функції. При помірній недостатності МДД повинна становити 1000 мг/добу для перорального застосування; тяжка недостатність – МДД повинна становити 500 мг/добу для перорального застосування. Застосування препарату у формі крапель для цієї категорії пацієнтів не вивчалось.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цисплатин	Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Протипоказаний при порушеннях функції нирок	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Циталопрам	За наявності недостатності доза може бути зменшена до нижньої межі щоденної дози	Дозові обмеження не є обов'язковими у випадку наявності ниркової недостатності незначного чи середнього ступеня тяжкості	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цитарабін	Протипоказаний при недостатності. З обережністю при порушеній функції.	Протипоказаний при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цитизин	При недостатності функції препарат слід призначати лише після уважної оцінки співвідношення користь/ризик	При недостатності функції препарат слід призначати лише після уважної оцінки співвідношення користь/ризик	У хворих з ІХС, СН, АГ, цереброваскулярними захворюваннями, облітеруючими артеріальними захворюваннями препарат слід призначати лише після уважної оцінки співвідношення користь/ризик	Спеціальних рекомендацій немає
Цитиколін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Цитохром С	Застосовується згідно інструкції	Спеціальних рекомендацій немає	Застосовується згідно інструкції	Застосовується згідно інструкції
Ціанамід	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при недостатності. З обережністю застосовувати.	Протипоказаний при тяжких ССЗ.	Протипоказаний при легеневій недостатності.
Ціанокобаламін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	протипоказаний при стенокардії напруження; у осіб зі схильністю до тромбоутворення і хворих на стенокардію в процесі лікування необхідно дотримуватись обережності і контролювати показники згортання крові.	Спеціальних рекомендацій немає

Шпунковий сік	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
---------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------